



## Inleiding

### INL. 1. Totstandkoming en doel van het Repertorium

Het *Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium* (hier verder vermeld als “het Repertorium”) wordt gepubliceerd door het “**Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie**” (BCFI). Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (zie [bcfi.be](http://bcfi.be) &gt; Over ons).

#### Revisieproces

- *Jaarlijkse revisie*: de Inleiding van het Repertorium en de teksten van elk hoofdstuk worden eenmaal per jaar volledig herzien. De ge-update teksten worden tussen december en juni op de website gepubliceerd. De laatste volledige revisie van deze Inleiding werd gepubliceerd in juni 2024.
- *Continue updating*: de specialiteiten op de website worden minstens driemaal per maand bijgewerkt (zie *Inl.2.11.2*). Ook belangrijke aanpassingen in de rubriek “Plaatsbepaling” en andere rubrieken gebeuren doorheen het jaar.

#### PDF-versies

**PDF-versies** van het Repertorium kunnen gedownload worden:

- **PDF van de huidige versie** van het Repertorium: met specialiteiten of zonder specialiteiten, van het volledige Repertorium of per hoofdstuk: via de *mainpage van het Repertorium* &gt; *Het repertorium in PDF (recentste versie)*.
- **Archief-PDF-versies** van de edities vanaf 2005: via de *mainpage van het Repertorium* &gt; *Archief (PDF-versie)*.

U vindt de **mobiele app van het Repertorium** in de Google Play Store (Android) en de Apple Store (iOS) door te zoeken op de term “BCFI”.

#### Doel van het Repertorium

Het doel van het Repertorium is onafhankelijke en praktisch bruikbare informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan gezondheidswerkers. De bedoeling is het **rationeel gebruik van geneesmiddelen** te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, dosering, interacties...) en dat men rekening houdt met hun kostprijs. In dit verband dient de notie van “op evidentie gebaseerde farmacotherapie” te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt in haar ‘*Guide to Good Prescribing*’ aan om bij het voorschrijven van een geneesmiddel rekening te houden met volgende criteria: **werkzaamheid, veiligheid, geschiktheid voor de individuele patiënt** (o.a. contra-indicaties en farmaceutische vorm) en kostprijs. Men dient hierbij rekening te houden met de **kostprijs** voor het individu en deze voor de gemeenschap. Daarom worden in het Repertorium de prijzen van de verschillende verpakkingen en hun eventuele terugbetalingsvoorwaarden gegeven. Er zijn ook prijsvergelijkingstabellen beschikbaar, zichtbaar na aanklikken van “per groepsnaam” of van het eurosymbool ter hoogte van de verpakking (zie *Inl.2.11.4*).

#### Website [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)

Op de website kunnen onder de **hoofding “Publicaties”**, naast het **Repertorium**, ook volgende **BCFI-publicaties** worden geraadpleegd

- de **Folia** en de **Folia Tandartsen**,
- de **Update geneesmiddelen**: zie ook *Inl.2.11.2*,
- het **Formularium Ouderenzorg**: zie ook



- *Inl.2.12.*, in verband met symbool
- *Inl.2.7.* en
- *Inl.6.6.*
- de Toolbox.

Onder de hoofding “Publicaties” vindt u ook de **Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk** (een uitgave van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid = BAPCOC).

Onder de **hoofding “Vorming”** vindt u de link naar het **Auditorium** (ons e-learningplatform).

Op de homepage verschijnen onder de titel **Nieuws** al onze berichten en artikels.

Via onze wekelijkse nieuwsbrief **Weekly Folia** bezorgen we **elke vrijdag** een samenvatting van de nieuwe Folia-artikels die verschenen zijn op onze website en berichten we over nieuwe e-learning's en geven we informatie van onze partners (bv. Minerva, FAGG). **Inschrijven op de Folia Weekly kan via deze link.** De laatste vrijdag van de maand worden alle Folia-artikels van de maand gebundeld in PDF, die gemakkelijk kan gedownload worden. Alle Folia-artikels zijn online beschikbaar, gegroepeerd per maand, via de *mainpage van de Folia*.

Op de website van de **diergeneeskundige afdeling van het BCFI** ([www.vetcompendium.be](http://www.vetcompendium.be), bestemd voor dierenartsen en apothekers) is de farmacotherapeutische informatie over de in België beschikbare geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik terug te vinden.

### **Auteurschap**

De Redactieraad schrijft, en is verantwoordelijk voor het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium.

De Redactieraad is als volgt samengesteld:

- Hoofdredeurs: Prof. Dr T. Christiaens, Prof. Dr J.M. Maloteaux, Dr. E. Van Leeuwen en Prof. Dr. G. Faron
- Redacteurs: A. Baitar, C. Bertrand, B. Bosier, L. Cuitte, C. Defrance, C. Denis, S. Desmaele, C. Devillers, E. Dhaenens, G. Goesaert, H. Habraken, L. Heremans, N. Mortier, S. Thooft, J. Vandenhoven, A. Van Ermen, C. Veys

De Redactieraad wordt bijgestaan door de équipes Monitoring literatuur (N. Mortier, A. Nonneman (WOREL)), Specialiteiten (L. Hamtiaux, I. Latour), Administratieve ondersteuning (C. De Smet, J. Neyt, M. Rymen), Informatica (O. Couneson, S. Dumon, J. Simon, C. Romain), Communicatie (F. Coppens), Vertaling (V. Mortelmans, J. De Bie) en Directie (S. Brillon).

De leden van de Redactieraad ondertekenden een belangenverklaring en moeten deze jaarlijks bevestigen. De redactieleden mogen geen enkel belang hebben in de farmaceutische sector.

### **Dankwoord aan de experts**

Bij de jaarlijkse herziening worden de verschillende hoofdstukken van het Repertorium nagelezen door experts in elk domein. In het kader van een algemene transparantie en voor de redactionele beoordeling door het BCFI wordt aan de experts gevraagd belangen die zouden kunnen leiden tot belangenconflicten, mee te delen. Wij danken in het bijzonder volgende experts die voor deze editie van het Repertorium hun commentaren bezorgden: K. Allegaert, J.-F. Baurain, H. Beele, M. Berlière, A. Berquin, D. Bijl, E. Bottiau, K. Boussey, S. Callens, P. Carillo-Santisteve, R. Cauwels, M. Ceulemans, S. Croubels, C. Daumerie, G. De Backer, T. De Backer, F. De Keyser, E. De Leenheer, G. De Loof, P. De Paepe, A. De Sutter, E. Delgrange, T. Deltombe, J. Devulder, N. D'Haese, P.-H. Deprez, P. Depuydt, D. Duprez, P. Durez, K. Everaert, B. Keymeulen, G. Laekeman, H. Lapeere, J. Lasudry, R. Lefebvre, J. Longueville, U. Maniewski-Kelner, C. Martin, F. Matthys, B. Morlion, M.C. Nassogne, F. Nobels, A. Peeters, A. Persu, M. Petrovic, C. Pilette, M. Ponchon, D. Reckelbus, H. Reyckler, T. Roisin, S. Rottey, P. Schelstraete, J. Schoenen, S. Smet, J.-P. Thissen, B. Tombal, G. Top, G. T'Sjoen, J. Van Acker, L. Van Bortel, S. Van Daele, L. Vansnick, S. Van Wessel, M. Van Winkel, H. Verhelst, H. Verstraeten, K. Verstraete, J. Warlin, R. Westhovens, C. Wyns. We verontschuldigen ons indien we iemand zouden zijn vergeten.

De werkgroep Formularium Ouderenzorg (zie Inl.6.6. Geneesmiddelen bij ouderen – Formularium Ouderenzorg – Selecties 80+) is als volgt samengesteld: A. Dahmane, B. D'Hooghe, M. Hanset, B. Henkens, G. Mertens, D. N'Chweki,



A. Parada, S. Valentin, J. Van Elsen, K. Venneman, E. Vincke, H. Warie. We danken hen voor hun medewerking aan de update van de selecties in het Formularium Ouderenzorg.

## INL. 2. Handleiding bij en onderbouwing van het Repertorium

Om een rationele keuze te vergemakkelijken, zijn in het Repertorium **de in België beschikbare geneesmiddelspecialiteiten** op basis van hun farmacologische en therapeutische eigenschappen gegroepeerd in **twintig hoofdstukken**. Meestal zijn er per hoofdstuk meerdere klassen geneesmiddelen.

### INL. 2.1. Onderbouwing van het Repertorium

Hieronder worden voor de verschillende rubrieken van het Repertorium de inhoud en de gevolgde methodologie toegelicht, gevolgd door uitleg over de specialiteiten. We verwijzen ook naar het document “*Methodologie voor de publicaties van het BCFI*”, dat u kunt raadplegen via [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be) > Over ons > Onze missie.

We verwijzen ook naar de **e-learning**: “*Wegwijs in het Repertorium*”.

Het BCFI systematisch volgt een aantal standaardbronnen op: een aantal tijdschriften (o.a. *BMJ*, *JAMA*, *Lancet*, *NEJM*), de *Cochrane Database of Systematic Reviews*, een aantal Journal Clubs (bv. *NEJM J Watch* en *ACP Journal Club*), ISDB-tijdschriften en andere onafhankelijke geneesmiddeleninformatiebronnen (bv. *Australian Prescriber*, *Drug and Therapeutic Bulletin*, *La Revue Prescrire*, *Geneesmiddelenbulletin*, *The Medical Letter*), de richtlijnen van een aantal organisaties (o.a. *NHG*, *NICE*). Ook de berichten van gezondheidsinstanties (vooral FAGG en EMA) en praktijkrelevante implicaties van de beslissingen van deze instanties komen aan bod.

### INL. 2.2. Rubriek “Plaatsbepaling”

De bedoeling van deze rubriek is de geneesmiddelen te situeren vanuit het standpunt van het BCFI en een rationele keuze te vergemakkelijken. Voor elke klasse van geneesmiddelen worden in deze rubriek de voor- en nadelen van de verschillende geneesmiddelen gegeven.

Waar mogelijk steunt het BCFI zijn oordeel op correct uitgevoerd gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek, met de nodige aandacht voor de selectie van de onderzoekspopulatie en de keuze van klinisch relevante eindpunten (mortaliteit, morbiditeit, levenskwaliteit). Bij gebrek aan dit type studies moet men er op bedacht zijn dat de kwaliteit van de onderbouwing minder sterk is; in de rubriek “Plaatsbepaling” wordt dit verduidelijkt.

De boodschappen in de rubriek “Plaatsbepaling” worden getoetst met andere EBM-bronnen, in eerste instantie de evidence-based decision-support bronnen *BMJ Best Practice* en eventueel ook *DynaMed*®.

In het document “*Methodologie voor de publicaties van het BCFI*” sur [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be) > Over ons > Onze missie.

In de rubriek “Plaatsbepaling” worden soms therapeutische toepassingen besproken die (nog) niet als indicaties in de SKP te vinden zijn (*off-label* gebruik); als een indicatie wordt besproken die niet in de SKP staat, wordt dit expliciet vermeld [in verband met *off-label* voorschrijven van geneesmiddelen, zie *Folia december 2021*].

Sommige geneesmiddelen hebben een duidelijk negatieve risico-batenverhouding: dit wordt aangeduid door een expliciete vermelding in de tekst, of door de vermelding “Dosering -- (negatieve risico-batenverhouding, zie rubriek “Plaatsbepaling”).

Het BCFI hanteert geen specifieke benadering voor geneesmiddelen op basis van planten [zie *Folia juli 2015*] of voor homeopathische geneesmiddelen [zie *Folia november 2010*]: elk geneesmiddel, van welke aard ook, dient geëvalueerd te worden op basis van bewezen doeltreffendheid, veiligheid, kwaliteit, gebruiksgemak en prijs.



### INL. 2.3. De rubriek “Indicaties (synthese van de SKP)”

In het Repertorium worden niet noodzakelijk alle indicaties vermeld die in de SKP staan; daarom is de rubriekstitel “Indicaties (synthese van de SKP)”. Er wordt gestreefd naar een vereenvoudiging van wat in de rubriek “Indicaties” van de SKP staat.

Sommige generieken hebben niet alle indicaties van het referentiemiddel als indicatie in hun SKP; in het Repertorium wordt hiermee geen rekening gehouden.

In de rubriek “Indicaties” van het Repertorium worden geen indicaties vermeld die niet in de SKP staan; waar relevant worden “off-label” indicaties vermeld in de rubriek “Plaatsbepaling” (zie hoger).

### INL. 2.4. De rubriek “Contra-indicaties”

Als voornaamste bron voor de contra-indicaties opgenomen in het Repertorium worden volgende bronnen gebruikt: *British National Formulary*, *Martindale* en de belangrijkste contra-indicaties in de SKP. Voor recent geïntroduceerde geneesmiddelen baseren we ons op de belangrijkste contra-indicaties in de SKP. Het onderscheid tussen “contra-indicaties” en “bijzondere voorzorgen” (zie *Inl.2.9.*) is dikwijls moeilijk en deze informatie wordt soms verschillend gecatalogeerd in de SKP van analoge producten.

In sommige SKP's wordt het gelijktijdig toedienen van bepaalde andere geneesmiddelen als contra-indicatie vermeld omwille van een risico van interactie. In het Repertorium worden interacties niet als contra-indicatie vermeld, omdat dit door de firma's niet systematisch wordt gedaan. De methodologie rond interacties wordt vermeld in *Inl.2.8.*

In de meeste SKP's wordt allergie aan het actieve bestanddeel of andere bestanddelen van het geneesmiddel als contra-indicatie vermeld. In het Repertorium wordt dit niet als contra-indicatie opgenomen.

- **Nierinsufficiëntie als contra-indicatie**
  - In de rubriek “Contra-indicaties” in dit Repertorium wordt (ernstige) nierinsufficiëntie alleen vermeld indien dit expliciet in de desbetreffende rubriek van de SKP staat.
  - Ter hoogte van de specialiteiten wordt met een symbool aangeduid of er in de SKP een dosisreductie of contra-indicatie bij nierinsufficiëntie wordt geadviseerd. Wanneer er tussen de SKP van specialiteiten op basis van hetzelfde actieve bestanddeel op dit gebied verschillen bestaan, wordt het meest voorzichtige symbool gekozen.
  - Het **symbool**  betekent dat in de SKP dosisreductie of contra-indicatie bij ernstige nierinsufficiëntie (gedefinieerd als creatinineklaring van 15 tot 30 ml/min./1,73m<sup>2</sup>) wordt geadviseerd.
  - Het **symbool**  betekent dat in de SKP dosisreductie of contra-indicatie reeds wordt geadviseerd vanaf matige nierinsufficiëntie (vanaf een creatinineklaring van 60 ml/min./1,73m<sup>2</sup> of lager), of bij nierinsufficiëntie zonder verdere vermelding van de ernst.
  - Bij ESRD (*End Stage Renal Disease*, gedefinieerd als creatinineklaring lager dan 15 ml/min./1,73m<sup>2</sup>) zijn er altijd speciale voorzorgen te nemen in verband met dosisreductie of contra-indicaties: gezien dit behoort tot de specialistische praktijk wordt dit in het Repertorium niet vermeld.
  - De symbolen worden toegekend op basis van de informatie in de SKP. Er dient opgemerkt dat in de SKP deze boodschappen wisselend en soms onduidelijk verwoord worden. Interpretatie speelt in zekere mate mee in het toekennen van de hierboven vermelde symbolen. Er is ook in vele gevallen geen overeenkomst tussen wat in de SKP vermeld wordt, en wat in allerlei bronnen daaromtrent wordt gezegd; daarenboven zijn er dikwijls discrepanties tussen bronnen onderling.  
**Nota:** indien in de SKP of in publicaties gewaarschuwd voor een risico bij gebruik in geval van nierinsufficiëntie, zonder dat er een contra-indicatie is of dat dosisvermindering wordt



aanbevolen, kan de redactie toch kiezen om een niersymbool toe te kennen.

- **Leverlijden als contra-indicatie**

- In de rubriek “Contra-indicaties” van dit Repertorium wordt leverlijden slechts vermeld als dit expliciet in de rubriek “Contra-indicaties” van de SKP staat. Daarbij worden meestal de termen “leverinsufficiëntie” of “ernstige leverinsufficiëntie” gebruikt naargelang de vermelding in de SKP. Meestal is er in de SKP geen vermelding of het bij leverlijden om cirrose gaat.
- Specifiek rond cirrose als contra-indicatie, is informatie terug te vinden in het hoofdstuk “Levercirrose” van Commentaren Medicatiebewaking (Nederland, betalend). Commentaren Medicatiebewaking steunt zich in dit verband op de vrij beschikbare website [www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl](http://www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl). Er dient op gewezen te worden dat de Nederlandse evaluatie slechts voor een deel van de geneesmiddelen is gebeurd. In deze bron worden sommige geneesmiddelen als “onveilig bij levercirrose” beoordeeld, d.w.z. te vermijden, wat overeenkomt met een contra-indicatie. Waar dit het geval is wordt dit vermeld in onze rubriek “Contra-indicaties”, los van wat in de SKP staat.
- In zeldzame gevallen is een middel volgens de SKP gecontra-indiceerd bij leverlijden, maar wordt het in de Nederlandse evaluatie beoordeeld als “veilig bij levercirrose”. In dat geval wordt dit **expliciet** vermeld in onze rubriek “Contra-indicaties”.

## INL. 2.5. Rubriek “Ongewenste effecten”

Voor de algemene principes betreffende ongewenste effecten en details over een aantal ongewenste effecten, zie *Inl.6.2*.

Hoe passen wij deze principes toe in het Repertorium?

In het Repertorium worden alleen de belangrijkste ongewenste effecten vermeld: de frequente en deze met belangrijke klinische gevolgen. Als voornaamste bronnen worden gebruikt: *Martindale*, *British National Formulary*, *Farmacotherapeutisch Kompas* en de SKP's, alsook waarschuwingen van gezondheidsinstanties zoals het Belgische FAGG en het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. Voor recent geïntroduceerde geneesmiddelen baseren we ons op de belangrijkste ongewenste effecten in de SKP. Het blijft zeer moeilijk binnen de ongewenste effecten een keuze te maken tussen volledigheid en overzicht.

Voor meer details blijft het noodzakelijk de SKP en andere bronnen te consulteren.

## INL. 2.6. Rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”

Voor de algemene principes over gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, zie *Inl.6.4*. en *Inl.6.5*.

Hoe passen wij deze principes toe in het Repertorium?

- *In verband met zwangerschap*
  - Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gegevens bij de mens. Hoewel gegevens over teratogeniteit bij het dier vaak geen voorspellende waarde hebben voor de mens, vermelden we toch zeer ernstige problemen bij het dier wanneer er onvoldoende gegevens bij de mens beschikbaar zijn.
  - **De meest ernstige problemen bij de mens worden in vetjes weergegeven.**
  - We hanteren volgende criteria.
    - Bij bewezen teratogeniteit melden we dat gebruik tijdens de zwangerschap *gecontra-indiceerd* is, en nemen we dit ook op in de rubriek “Contra-indicaties”.
    - Bij vermoeden van teratogeniteit, perinatale problemen of langetermijneffecten, melden we dat gebruik tijdens de zwangerschap af te raden is, en moeten de risico's voor moeder en kind grondig worden afgewogen tegenover het verwachte voordeel van de behandeling.
    - Als er geen aanwijzingen zijn voor aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten bij het kind, melden we “De gegevens over gebruik van deze preparaten tijdens de zwangerschap zijn geruststellend. Er zijn geen aanwijzingen voor aangeboren afwijkingen of andere nadelige



- effecten bij het kind op basis van onze bronnen.”
- Als het is niet mogelijk is om een uitspraak te doen, melden we “Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid van gebruik van deze preparaten tijdens de zwangerschap (geen of onvoldoende informatie beschikbaar).”
  - *In verband met borstvoeding*
    - Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gegevens bij de mens.
    - We vermelden voor welke geneesmiddelen een schadelijk effect bewezen is, of waarvoor er sterke vermoedens bestaan. **De meest ernstige problemen bij de mens worden in vetjes weergegeven.**
  - De **SKP** wordt niet systematisch als primaire bron gebruikt: dikwijls wordt hierin een defensieve houding aangenomen (bv. “niet gebruiken bij gebrek aan voldoende gegevens”) en in de SKP's van de verschillende specialiteiten met eenzelfde actief bestanddeel vindt men soms heel verschillende standpunten voor eenzelfde probleem (gaande van een absolute contra-indicatie tot gebruik “als de verwachte voordelen opwegen tegen het risico”).
  - Als **voornaamste bronnen** worden een aantal standaardwerken over zwangerschap en borstvoeding gebruikt: *Drugs in Pregnancy and Lactation. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk (Briggs)* en de websites van het “*Bijwerkingencentrum Lareb*” (Nederland) en van *Le CRAT (Le Centre de Référence sur les Agents Tératogènes, Frankrijk)*. Indien een geneesmiddel niet in deze bronnen is opgenomen, omdat het niet beschikbaar is of pas recent is gecommercialiseerd, wordt de SKP als bron genomen en vermelden we tussen haakjes “SKP”.
  - Een rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” ontbreekt in het Repertorium op dit ogenblik nog bij een aantal geneesmiddelen(groepen). Dit betekent dat er geen verontrustende gegevens gevonden werden in onze bronnen. Dit betekent uiteraard niet dat volledige veiligheid kan aangenomen worden: zowel voor oude als voor recent geïntroduceerde producten zijn dikwijls zeer weinig gegevens beschikbaar. Om onduidelijkheid te vermijden is het de bedoeling zo snel mogelijk bij elke geneesmiddelengroep een rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” te vermelden.

## INL. 2.7. De rubriek "Ouderen"

- In het kader van de update 2025 van het Repertorium wordt in sommige hoofdstukken een nieuwe rubriek “Ouderen” toegevoegd naarmate de update vordert (het einde van de herziening is gepland voor december 2025).
- De rubriek “Ouderen” geeft specifieke informatie over het gebruik van geneesmiddelen uit verschillende therapeutische klassen bij oudere personen. De aandacht gaat vooral naar de geneesmiddelen die het vaakst worden voorgeschreven in de eerste lijn en ook naar geneesmiddelen die bepaalde risico's met zich meebrengen voor oudere patiënten (aanpassing van de dosis bij nierinsufficiëntie, een nauwe therapeutisch-toxische marge, anticholinerge effecten, een krachtige inhibitor of inductor van CYP-enzymen,...).
- Sommige minder vaak gebruikte geneesmiddelenklassen kregen geen specifieke beoordeling. Het ontbreken van een rubriek “Ouderen” bij die geneesmiddelen in ons Repertorium betekent echter niet dat het niet nodig is voorzichtig te zijn wanneer ze worden gebruikt bij ouderen.
- De informatie in de rubriek “Ouderen” is voornamelijk afkomstig van het “Formularium Ouderenzorg”: zie *Inl.6.6.* voor meer details. De geraadpleegde bronnen zijn dezelfde als die van het Repertorium (zie *Inl.2.1.*), met bijkomend 3 geriatrische tijdschriften: *Age and Ageing*, *Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA)* en *Journal of the American Geriatrics Society (JAGS)*.
- Zodra alle rubrieken “Ouderen” in het Repertorium zijn geïntegreerd (eind 2025), zullen ze elk jaar worden herzien in het kader van de jaarlijkse revisie van het Repertorium.

## INL. 2.8. De rubriek “Interacties”

Voor de algemene principes over interacties, zie *Inl.6.3.*  
Hoe passen wij deze principes toe in het Repertorium?



In de rubrieken “Interacties” in het Repertorium worden zowel farmacodynamische interacties als farmacokinetische interacties vermeld.

De farmacokinetische interacties betreffen vooral de interacties ter hoogte van cytochroom P450 (CYP) en P-glycoproteïne (P-gp). Naast de informatie in de rubrieken, zijn er ook volgende tabellen:

- *Tabel 1c.* en *Tabel 1e.*: de substraten, de inhibitoren en de inductoren van de verschillende CYP-iso-enzymen;
- *Tabel 1d.* en *Tabel 1e.*: de substraten, de inhibitoren en de inductoren van P-gp.

In *Tabel 2a.* in 2.1.2.1.1. worden de interacties met de vitamine K-antagonisten vermeld; het gaat daarbij zowel om farmacokinetische als om farmacodynamische interacties.

### INL. 2.8.1. Methodologie voor de farmacodynamische interacties

*Stockley's Drug Interactions* en *Stockley's Herbal Medicines Interactions* (voor geneesmiddelen op basis van planten) worden als voornaamste bron gebruikt. Voor nieuwe geneesmiddelen die dikwijls nog niet in de standaardwerken zijn opgenomen en voor geneesmiddelen die specifiek zijn voor de Belgische markt is de informatie gebaseerd op de klinisch relevante interacties vermeld in de SKP. Het niet vermelden in het Repertorium van een interactie betekent niet dat er zich geen probleem kan voordoen.

### INL. 2.8.2. Methodologie voor de CYP-interactietabellen en de P-gp-interactietabellen

Deze tabellen komen tot stand via een gestandaardiseerde methodologie.

- **De CYP- en P-gp-substraten:** substraten worden enkel opgenomen wanneer ze in de recentste editie van minstens één van de volgende bronnen worden geciteerd: (1) *Stockley's Drug Interactions* en (2) voor geneesmiddelen beschikbaar gekomen vóór 2022 *The Top 100 Drug Interactions*. Voor nieuwe geneesmiddelen (met symbool ▼) en voor geneesmiddelen die specifiek zijn voor de Belgische markt is onze informatie gebaseerd op de SKP; interacties vermeld in de SKP worden enkel opgenomen als er evidentie is uit “in vivo”-studies, niet op basis van gegevens uit “in vitro”-studies. Wanneer het symbool ▼ ter hoogte van de specialiteit wegvalt, wordt de informatie van de SKP getoetst aan de informatie in *Stockley's Drug Interactions*.
- **De CYP- en P-gp-inhibitoren en inductoren:** worden enkel opgenomen wanneer ze in de recentste editie van minstens twee van de volgende bronnen worden geciteerd: (1) *Stockley's Drug Interactions*, (2) voor geneesmiddelen beschikbaar gekomen vóór 2022 *The Top 100 Drug Interactions*, en (3) *Commentaren Medicatiebewaking*. Voor nieuwe geneesmiddelen (met symbool ▼) en voor geneesmiddelen die specifiek zijn voor de Belgische markt is de informatie gebaseerd op de SKP; interacties vermeld in de SKP worden enkel opgenomen als er evidentie is uit “in vivo”-studies, niet op basis van gegevens uit “in vitro”-studies. Wanneer het symbool ▼ wegvalt, wordt de informatie van de SKP getoetst aan de informatie in *Stockley's Drug Interactions* en *Commentaren Medicatiebewaking*.
- De substraten, inhibitoren en inductoren waarvan men verwacht dat ze de klinisch meest relevante interacties zullen geven, zijn **in vetjes aangeduid**. Dit wil niet zeggen dat interacties met niet-vetjes aangeduide geneesmiddelen geen risico inhouden.
  - De in **vetjes aangeduide substraten** betreffen een selectie van geneesmiddelen waarbij kleine doseringsschommelingen door gebruik samen met een inhibitor kunnen leiden tot ernstige ongewenste effecten: zie *Inl.6.2.* voor de betreffende geneesmiddelen.
  - De in **vetjes aangeduide** CYP- en P-gp-inhibitoren en -inductoren zijn de geneesmiddelen die in minstens twee van onze bronnen als “potente” inhibitor of inductor worden vermeld.
- In de interactietabellen worden prodrugs aangeduid door tussen haakjes “prodrug” toe te voegen. Prodrugs zijn geneesmiddelen die moeten worden gemetaboliseerd tot een actieve metaboliet om hun werking uit te oefenen. Voor CYP-gemedieerde interacties houdt dit bv. in dat een CYP-inductor het effect kan versterken (meer omzetting tot actieve metaboliet), en dat een CYP-inhibitor het effect kan verminderen (minder omzetting tot actieve metaboliet). Voorbeelden van ruim gebruikte prodrugs zijn:



clopidogrel, codeïne, tamoxifen en prasugrel.

Ondanks onze gestandaardiseerde methodologie blijft het geen gemakkelijke beslissing een bepaald substraat of een bepaalde inductor of inhibitor al dan niet te vermelden. Dikwijls ontbreekt immers de evidentie voor de klinische relevantie van de interacties en er is soms opvallende discrepantie tussen de verschillende bronnen. Het niet vermelden in het Repertorium van een interactie betekent niet dat elk interactierisico uitgesloten is.

## INL. 2.9. Rubriek “Bijzondere voorzorgen”

- In deze rubriek wordt, waar relevant, bijzondere aandacht gevraagd voor specifieke doelgroepen, bv. kinderen, patiënten met nierlijden (zie *Inl.6.1.2.*) of met leverlijden (zie *Inl.6.1.3.*). Daarnaast worden ook specifieke maatregelen vermeld die van belang zijn voor de patiënt, bv. bloedcontroles of op te volgen klinische parameters. Het is niet altijd duidelijk of een bepaald probleem in deze rubriek of in de rubriek “Contra-indicaties” dient vermeld te worden”.
- In dit Repertorium wordt ter hoogte van de specialiteiten aangeduid of er een dosisreductie of contra-indicatie bij nierinsufficiëntie wordt geadviseerd in de SKP. Voor meer uitleg, zie *Inl.2.4.*

## INL. 2.10. Rubriek “Dosering” of “Toediening en dosering”

Tenzij anders vermeld, zijn de doseringen die in dit Repertorium worden gegeven, deze voor volwassenen zonder manifeste nier- of leverfunctiestoornis, en dit in afwezigheid van belangrijke interacties.

Het gaat dikwijls om de dosering die in de SKP wordt gegeven. Deze dosering wordt wel getoetst aan gegevens uit de literatuur of uit de recentste editie van het standaardwerk *Martindale*; daardoor zijn er soms discrepanties tussen de dosering vermeld in het Repertorium en deze in de SKP.

De gevoeligheid van de eindorganen en de dispositie van het geneesmiddel in het organisme kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen: het gaat hier dan ook om gemiddelde doseringen die dikwijls dienen aangepast te worden in functie van de karakteristieken van de patiënt. In *Inl.6.1.* worden enkele algemene adviezen over de aanpassing van de dosering in functie van leeftijd, ziekte-toestanden en genetische aanleg, en over plasmaconcentratie-monitoring gegeven.

Voor specialiteiten voorbehouden voor hospitalgebruik of voor specialistisch gebruik, wordt geen dosering vermeld. Evenmin wordt de dosering gegeven voor geneesmiddelen voor uitwendig gebruik, voor hoestsiropen enz.

Wanneer in deze rubriek ook informatie worden gegeven over de wijze en/of het ogenblik van toediening, is de rubriekstitel “Toediening en dosering”.

Sommige geneesmiddelen hebben een duidelijk negatieve risico-batenverhouding: dit wordt aangeduid door een expliciete vermelding in de tekst, of door de vermelding “*Dosering --* (negatieve risico-batenverhouding, zie rubriek “Plaatsbepaling”).

## INL. 2.11. De specialiteiten

### INL. 2.11.1. Welke specialiteiten, medische hulpmiddelen en magistrale bereidingen worden vermeld?

In het Repertorium worden enkel middelen opgenomen die **als geneesmiddel vergund** (“geregistreerd”) en in **België gecommmercialiseerd** zijn. Deze gegevens worden geëxtraheerd uit de “Authentieke Bron Geneesmiddelen” (SAM, via *SAM viewer*). De als geneesmiddel vergunde en in België gecommmercialiseerde homeopathische middelen (bron: SAM) worden vermeld in het hoofdstuk “Diverse Geneesmiddelen”; zie 20.4.

Daarnaast worden ook **volgende medische hulpmiddelen** opgenomen: (1) de actieve verbandmiddelen waarvoor het RIZIV een tegemoetkoming voorziet voor patiënten met chronische wonden, en (2) de koperhoudende intra-uteriene devices (IUD's).

In de apotheek zijn ook producten beschikbaar die niet als geneesmiddel zijn vergund, zoals voedingssupplementen en cosmetische producten, maar die er soms uitzien als geneesmiddelen; deze producten worden niet vermeld in dit Repertorium. Een discussie over planten als geneesmiddel en als voedingssupplement



is te lezen in *Minerva* 2021;20:66-8.

**Magistrale bereidingen** worden in het Repertorium enkel vermeld wanneer geen adequate specialiteit beschikbaar is. Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) wordt in principe als bron genomen wanneer in dit Repertorium een magistrale bereiding wordt voorgesteld. Het *TMF* wordt uitgegeven door het FAGG, en bevat magistrale bereidingen gevalideerd voor wat betreft bereiding en stabiliteit.

### INL. 2.11.2. Updating van de informatie over de specialiteiten

Via de homepage vindt u onder de hoofding *Publicaties > Update geneesmiddelen* per maand de nieuwe actieve bestanddelen en de voor de algemene praktijk belangrijke wijzigingen met betrekking tot nieuwe indicaties, terugbetalingen, stopzettingen van commercialisatie, langdurige onbeschikbaarheden en kritische onbeschikbaarheden. Deze info wordt ook in de *Folia* opgenomen onder de rubriek “Nieuwigheden geneesmiddelen”.

In de rubriek *Update geneesmiddelen* zijn ook elke maand in PDF de belangrijkste wijzigingen over de specialiteiten in het Repertorium te vinden.

**Nota:** wanneer u zoekt naar een **pas gecommmercialiseerde specialiteit die nog geen plaats in het Repertorium heeft gekregen**, wordt u doorverwezen naar een tijdelijke pagina waar u voor de specialiteit reeds de samenstelling, farmaceutische vorm, sterkte, prijs, wettelijk kader en terugbetalingsmodaliteiten, evenals de SKP en de bijsluiter kan raadplegen.

### INL. 2.11.3. De specialiteitsnaam

Als **specialiteitsnaam** wordt in dit Repertorium de benaming van het geneesmiddel vermeld, zonder toevoeging van de sterkte en de farmaceutische vorm. Termen zoals bv. Retard en Forte worden vermeld bij de farmaceutische vormen wanneer ze deel uitmaken van de officiële benaming van het geneesmiddel.

### INL. 2.11.4. Weergave “Per groepsnaam”, prijsvergelijkingstabellen en codes

- In de weergave “**per groepsnaam**” (**symbool** ter hoogte van de verpakking) worden de specialiteiten gerangschikt per **VOS-groep** (VOS = voorschrijven op stofnaam). Een VOS-groep omvat de specialiteiten met hetzelfde actief bestanddeel (of combinatie van actieve bestanddelen), dezelfde sterkte en dezelfde toedieningsweg. Indien relevant specificeren we in de donkergrijze balk van de VOS-groep de indicatie (zie bv. acetylsalicylzuur, bupropion) de frequentie van toediening (zie bv. estradiol transdermaal), de sterkte (zie bv. influenzavaccins) of samenstelling (zie bv. pneumokokkenvaccins).
- **Per VOS-groep** is een **tabel met prijsvergelijkingen van de specialiteiten** te raadplegen.
  - Door het **aanwijzen van de specialiteitsnaam** krijgt men informatie over het CTI-extended nummer, het CNK-nummer, de ATC-code, de DDD (Defined Daily Dose) en DDU (*Defined Dose Unit*), of het al dan niet een “grote verpakking” betreft, en of de specialiteit onderworpen is aan tarifiering per eenheid voor personen in woonzorgcentra (zie ook Inl.5.). Voor info over CTI-extended, CNK en ATC, zie *verklarende woordenlijst op Farmastatus.be*. Voor info over DDD en DDU, [zie *Folia april 2006*].
  - De vermelding “**no switch**” betekent dat overschakeling van de ene specialiteit naar de andere best vermeden wordt (bv. bij geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge, zie Inl.6.2.). De vermelding “**no VOS**” betekent dat afgeraden wordt om het geneesmiddel op stofnaam voor te schrijven (bv. multifasische anticonceptie). Door het *hoveren* over de vermeldingen krijgt men meer informatie omtrent de reden. Over voorschrijven op stofnaam (VOS): zie Inl.3.
  - In aparte kolommen worden vermeld:
    - “**prijs publiek**”: publieksprijs voor de ganse verpakking.
    - “**remgeld**”: remgeld voor personen met reguliere tegemoetkoming. Bij klikken op de pijltjes onder vorm van rechthoek () wordt het remgeld voor personen met verhoogde tegemoetkoming getoond.
    - “**index publiek**”: dit is de verhouding van de publieksprijs per eenheid (bv. per tablet) van een specialiteit ten opzichte van de prijs per eenheid van de goedkoopste specialiteit. De index is dus



gelijk aan 1 voor de goedkoopste specialiteit. Bij klikken op de pijltjes onder vorm van rechthoek () wordt de “**eenheidsprijs publiek**” vermeld, dit is de prijs (in eurocent) per eenheid.

- “**index remgeld**”: dit is de verhouding van het remgeld per eenheid (bv. per tablet) van een specialiteit ten opzichte van het remgeld per eenheid van de goedkoopste specialiteit. De index is dus gelijk aan 1 voor de goedkoopste specialiteit. Bij klikken op de pijltjes onder vorm van rechthoek () wordt de “**eenheidsprijs remgeld**” vermeld, dit is het remgeld (in eurocent) per eenheid.
- In de **afleveromgevingen ambulant, hospitaal en ROB/RVT** wordt ook de **prijs per tarifieringseenheid** in de respectievelijke afleveromgeving vermeld.

#### INL. 2.11.5. De firmanaam

De **firmanaam** is deze van de firma die de “vergunning voor het in de handel brengen” bezit, en die verantwoordelijk is voor de informatie. De firmanaam wordt telkens tussen haakjes bij elke specialiteitsnaam vermeld.

Indien het gaat om een buitenlandse firma wordt de Belgische verdeler of lokale vertegenwoordiger vermeld. Indien er in België geen contactpunt is, wordt de buitenlandse firma vermeld.

#### INL. 2.11.6. De samenstelling aan actieve bestanddelen en de sterkte, en “hulpstoffen met erkende werking”

De **samenstelling aan actieve bestanddelen** wordt voor elke specialiteit vermeld. De Nederlandstalige versie van de algemene internationale benaming (*International Non-Proprietary Name of INN*) van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gebruikt wanneer deze beschikbaar is.

De **sterkte van het geneesmiddel** is de hoeveelheid actief bestanddeel per eenheid. Een geneesmiddelenmolecule kan beschikbaar zijn als zout, ester of ander derivaat. Wanneer de vermelde **sterkte van het geneesmiddel** slaat op de volledige molecule (bv. zout of ester), volgt dit bijgevoegde deel na een komma, bv. “morfine, sulfaat”. Wanneer de vermelde sterkte van het geneesmiddel gebaseerd is op de actieve component van de molecule alleen, wordt in het Repertorium het bijgevoegde deel tussen haakjes getoond, bv. “naloxon (hydrochloride)”.

**Hulpstoffen met erkende werking** zijn hulpstoffen die bij bepaalde patiënten voorzorgsmaatregelen noodzakelijk kunnen maken (zie website *FAGG*, website *EMA* en de *EMA-lijst van hulpstoffen met erkende werking* voor meer details). Het gaat onder andere om bepaalde kleurstoffen of bewaarmiddelen, ethanol, aspartaam, gluten. Bij overschakelen van de ene specialiteit naar de andere (zie *Inl.3.*) is het nuttig de aanwezigheid van kleurstoffen of bewaarmiddelen na te gaan bij voorschrijven voor patiënten met allergische antecedenten, de aanwezigheid van aspartaam bij patiënten met fenyketonurie, de aanwezigheid van fructose, sacharose en/of sorbitol bij patiënten met congenitale fructose-intolerantie, of de aanwezigheid van gluten bij coeliakie-patiënten.

De hulpstoffen worden steeds vermeld in de SKP. In het Repertorium worden voor de vaccins de allergiserende hulpstoffen en voor de oftalmologische middelen de bewaarmiddelen vermeld ter hoogte van de specialiteiten, met een jaarlijkse update. Voor bruispreparaten wordt in de rubrieken “Bijzondere voorzorgen” gewezen op de aanwezigheid van natrium en de mogelijke problemen bij patiënten op een streng zoutarm dieet. Zie *Folia mei 2023*, met aandacht voor het signaal van verhoogd hartlijden en sterfte bij langdurig gebruik van geneesmiddelen met hoog natriumgehalte.

#### INL. 2.11.7. De toedieningswegen en farmaceutische vormen

De toedieningswegen en farmaceutische vormen worden vermeld op basis van gegevens uit de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP). Het BCFI gebruikt de standaardtermen en afgeleiden uit de “*European Directory for the Quality of Medicines & Healthcare*” (EDQM). De standaardtermen en hun definities kunnen geraadpleegd worden via <https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index>.

Een aantal termen die gebruikt worden in het Repertorium worden hier verduidelijkt (zie ook lijst afkortingen in *Inl.2.13.*).

- **In verband met de deelbaarheid van tabletten:**
  - De tabletten die *kwantitatief deelbaar* zijn, worden aangeduid als **tabl. (deelb. kwantit.)**: de breuklijn



laat toe om de tabletten in gelijke doses te delen.

- De tabletten die *niet kwantitatief deelbaar* zijn, worden aangeduid als **tabl. (deelb. niet kwantit.)**: de breuklijn dient enkel om de inname te vergemakkelijken. Voor deze tabletten werd ofwel geen deelbaarheidsstudie uitgevoerd ofwel kon niet aangetoond worden dat de dosis exact kon worden gehalveerd.
- Bij een aantal tabletten vermelden we enkel **(deelb.)**. Dit betekent dat de functie van de breuklijn niet is beschreven in de SKP of bijsluiter en dat de firma ons (nog) geen informatie daarover heeft toegestuurd.
- Er zijn apparaatjes (pillensnijders) in de handel om het delen van tabletten te vergemakkelijken.
- **Dispergeerbare (disp.) en oplosbare (oplosb.) tabletten** vallen in water uiteen met vorming van een suspensie, respectievelijk een oplossing. Deze tabletten kunnen evenwel meestal ook gewoon ingeslikt worden, dit in tegenstelling tot **bruistabletten (bruistabl.)** die steeds in water moeten worden opgelost.
- **Orodispergeerbare (orodisp.) tabletten** lossen snel op in de mond onder invloed van het speeksel en worden dan doorgeslikt. Door de firma's gebruikte als "Instant", "Odis" enz. vallen hieronder.
- *Buccaal, sublinguaal, gingivaal en oromucosaal*:
  - *buccale* toediening (bucc.) beoogt een systemisch effect door toediening in de buccale holte tussen tandvlees en wang;
  - *sublinguale* toediening (subling.) beoogt een systemisch effect door toediening onder de tong;
  - *gingivale* toediening (gingiv.) beoogt een lokaal effect door toediening t.h.v. het tandvlees;
  - *oromucosale toediening (oromuc.)* beoogt een lokaal of systemisch effect door toediening ter hoogte van het mondslijmvlies. De term *oromucosaal* wordt slechts gebruikt indien meer specifieke termen (zoals bv. sublinguaal, gingivaal, buccaal) niet van toepassing zijn, en het geen klassieke orale toediening (met inslikken) betreft.
- *Filmomhulde (filmomh.) en omhulde (omh.) tabl.* zijn tabletten zonder gewijzigde afgifte waarvan de omhulling het doorslikken vergemakkelijkt. Bij filmomhulde tabletten is een dunne polymeerfilm aanwezig, bij omhulde tabletten een dikkere *coating* met suiker of was. Deze termen mogen niet verward worden met de aanduiding *maagsapresistent (maagsapresist.)*, waarmee de bescherming tegen afbraak in het maagsap bedoeld wordt.
- *Verlengde (verl.) en geregleerde (geregul.) afgifte* zijn specificaties bij bepaalde farmaceutische vormen (o.a. vaste orale vormen, oogdruppels en injecteerbare vormen). Deze termen worden gebruikt om een gewijzigde afgifte van het actieve bestanddeel aan te duiden. In het Repertorium worden de termen gebruikt in de SKP overgenomen. *Verlengde afgifte* betekent volgens de EDQM-definitie dat het actieve bestanddeel trager wordt vrijgegeven dan normaal. *Geregleerde afgifte* daarentegen is een meer algemene aanduiding die wordt gebruikt voor een verandering in snelheid, plaats of tijdstip van afgifte van het actieve bestanddeel; deze term wordt enkel gebruikt wanneer de meer specifieke termen *maagsapresistent* of *verlengde afgifte* niet van toepassing zijn.

#### INL. 2.11.8. Vermelding "Verdovend middel" en "gelijkgesteld aan de verdovende middelen"

De vermelding "**verdovend middel**" wordt gebruikt voor specialiteiten onderworpen aan de reglementering van de verdovingsmiddelen. De vermelding "**gelijkgesteld aan de verdovende middelen**" wordt gebruikt wanneer een reglementering gelijkaardig aan deze van de verdovingsmiddelen van kracht is. Voor de specialiteiten met vermelding "verdovend middel" of "gelijkgesteld aan de verdovende middelen" moeten op het niet-elektronisch voorschrift de sterkte en het volume of aantal gebruikseenheden voluit geschreven worden. Deze verplichting is niet van toepassing voor het elektronisch voorschrift.

#### INL. 2.11.9. De termen "parallelinvoer" en "parallele distributie"

Een aantal geneesmiddelen wordt in België door verschillende firma's verdeeld onder dezelfde benaming. Deze praktijk is toegelaten als gevolg van het vrije verkeer van goederen op Europees niveau. De termen "**parallelinvoer**" (zie website FAGG) en "**parallele distributie**" (zie website EMA) worden vermeld ter hoogte van



deze specialiteiten.

Het onderscheid tussen parallelinvoer en parallelle distributie ligt enkel in de procedure die werd toegepast voor het verlenen van de “vergunning voor het in de handel brengen”: nationale procedure voor parallelinvoer, Europese centrale procedure voor parallelle distributie.

### INL. 2.11.10. Vermelding “weesgeneesmiddel”

“**Weesgeneesmiddel**” betekent dat het gaat om een geneesmiddel dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (*European Medicines Agency* of EMA) het statuut van weesgeneesmiddel kreeg (zie website Europese commissie voor hun geüpdatete lijst). De vermeldingen “weesgeneesmiddel” worden op de BCFI-website eenmaal per jaar geüpdated, rond de maand december.

Het statuut “weesgeneesmiddel” kan worden toegekend indien het middel gebruikt wordt bij een ernstige en zeldzame ziekte, zoals gedefinieerd door EMA.

Weesgeneesmiddelen kennen een specifieke registratieprocedure en deze houdt een aantal “incentives” in voor bedrijven, dit om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten te stimuleren [zie *Folia oktober 2007* en *website EMA*].

Er zijn ook enkele geneesmiddelen die het statuut van weesgeneesmiddel gekregen hebben van de Belgische autoriteiten. Deze worden eveneens vermeld op de BCFI-website. De meeste weesgeneesmiddelen worden in België terugbetaald in hoofdstuk IV of VIII (*a priori* controle, zie *Inl.5*).

### INL. 2.11.11. Doping in de sport

In het kader van **doping** in de sport is de WADA-lijst (*World Anti-Doping Agency*; [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)) van de verboden stoffen en methodes van kracht. De lijst wordt jaarlijks geüpdatet. In het Repertorium worden in verband met geneesmiddelen en doping twee symbolen gebruikt.

- Het symbool  wordt gebruikt voor (1) de specialiteiten die altijd verboden zijn (zowel binnen als buiten wedstrijdverband, en dit in alle sporten), (2) de specialiteiten die enkel verboden zijn binnen wedstrijdverband, en (3) de specialiteiten die enkel verboden zijn bij bepaalde sporten.
  - Elitesporters zijn verplicht om proactief een “Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak” (TTN) aan te vragen indien ze om medische redenen een dergelijk geneesmiddel moeten gebruiken.
  - Niet-elitesporters kunnen vooraf, maar ook na dopingcontrole (retroactief), een TTN aanvragen, maar indien de aanvraag geweigerd wordt, kan een disciplinair dossier volgen.
  - Door te *hoveren* over de dopingsymbolen, vindt men meer details.
- Het symbool  wordt gebruikt voor (1) de specialiteiten op basis van codeïne of ethylmorphine (die een positief testresultaat voor morphine kunnen geven), (2) de specialiteiten op basis van corticosteroïden die niet via orale, injecteerbare of rectale weg worden toegediend, (3) de specialiteiten op basis van adrenaline in combinatie met anesthetica, en (4) de specialiteiten voor toediening via inhalatie op basis van salbutamol, salmeterol, formoterol en vilanterol. Deze geneesmiddelen met symbool  zijn niet verboden, maar kunnen bij dopingcontrole toch een positief resultaat geven. Gebruik ervan moet gemeld worden aan de controle-arts.
- Bij een dopingcontrole noteren sporters best steeds alle medicatie en voedingssupplementen die ze de laatste 7 dagen vóór de controle gebruikt hebben op het dopingcontroleformulier.
- Voor details wordt verwezen naar de websites van de dopingbestrijding in de Vlaamse Gemeenschap ([www.dopingvrij.vlaanderen.be](http://www.dopingvrij.vlaanderen.be)) en de Franse Gemeenschap ([www.dopage.be](http://www.dopage.be)).

### INL. 2.11.12. Pletten van een geneesmiddel

Bij patiënten die via een sonde gevoed worden en bij patiënten met slikproblemen kan het noodzakelijk zijn het **geneesmiddel te pletten**. Dit kan problemen geven voor de biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel. Daarom mogen bijvoorbeeld geneesmiddelen met verlengde afgifte niet geplet worden. Meer informatie over problemen die kunnen optreden bij het pletten van een geneesmiddel, is soms te vinden in de SKP. Concrete adviezen per product zijn te vinden op <https://vza.be/bibliotheek-pletmedicatie/pletfiches> (initiatief van de Vlaamse



Vereniging voor Ziekenhuisapothekers).

### INL. 2.11.13. De SKP's en bijsluiters raadplegen

De **Samenvatting van de Kenmerken van het Product** (SKP, de vroegere wetenschappelijke bijsluiter) en de **bijsluiter voor het publiek** (de patiëntenbijsluiter) kunnen geraadpleegd worden via onze website.

- Voor de **“centraal vergunde” geneesmiddelen** is er ter hoogte van de specialiteit een “grote blauwe gelule” (), met de SKP en de bijsluiter voor het publiek, gebundeld in één enkel document. De *“centraal vergunde” geneesmiddelen* zijn de geneesmiddelen waarvoor de “vergunning voor het in de handel brengen” is afgeleverd door het *Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)*. **Let op !:** voor vele specialiteiten worden in dat ene document en achter elkaar de SKP's van verschillende sterktes of farmaceutische vormen vermeld. Hetzelfde geldt voor de bijsluiters voor het publiek, die volledig onderaan het document te vinden zijn. Niet alle sterktes/farmaceutische vormen hebben per se dezelfde indicaties of dezelfde doelgroep. Het is ook mogelijk dat bepaalde sterktes/farmaceutische vormen, ondanks hun vermelding, niet gecommmercialiseerd zijn in België.
- Voor **alle andere geneesmiddelen** is er ter hoogte van de specialiteit een “grote blauwe gelule” () en een “kleine blauwe gelule” (), voor respectievelijk de SKP en de bijsluiter voor het publiek. Het gaat om de *nationaal vergunde geneesmiddelen (FAGG)* en de *geneesmiddelen vergund via de decentrale/wederszijdse-erkenning procedure (EMA)*.

De toegang tot de SKP's en bijsluiters voor het publiek komt tot stand door een samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

### INL. 2.11.14. Onbeschikbare geneesmiddelen

- De vergunninghouders zijn in België verplicht om de tijdelijke onbeschikbaarheid of de definitieve stopzetting van de commercialisering van hun geneesmiddelen te melden aan het FAGG via FarmaStatus. De lijst van tijdelijk en definitief onbeschikbare geneesmiddelen kan geraadpleegd worden via *farmastatus.be*.
- Op onze website worden de verpakkingen waarvoor de vergunninghouder een **“tijdelijke onbeschikbaarheid”** heeft gemeld aan het FAGG, worden weergegeven in gegrijsde tekst en aangeduid met het symbool . Bij het hovern over het symbool wordt een datum van vermoedelijke terugkeer, een reden voor de onbeschikbaarheid en de impact voor de praktijk aangegeven (bron: FAGG).
- De namen van de specialiteiten waarvan de commercialisatie **definitief is stopgezet** blijven nog één jaar vindbaar in de zoekresultaten, met verwijzing naar een alternatief (zelfde toedieningsweg, sterkte en gelijkaardige farmaceutische vorm) wanneer beschikbaar. Wanneer het enkel gaat om de stopzetting van de commercialisatie van een bepaalde sterkte, farmaceutische vorm of verpakkingsgrootte, blijft deze gedurende één jaar vermeld onder de betrokken specialiteit.
- Wanneer de tijdelijke onbeschikbaarheid of definitieve stopzetting van de commercialisatie **een belangrijke impact** heeft (geen alternatieven beschikbaar), wordt dit gemeld in de rubriek “Update geneesmiddelen” onder de hoofding “Publicaties” op de homepage en in de rubriek “Nieuwigheden geneesmiddelen” in de Folia.
- Een geneesmiddel dat in België niet (meer) of tijdelijk onbeschikbaar is, mag ingevoerd worden uit het buitenland (zie *Inl.2.11.15.*).
- De apotheker mag een geneesmiddel waarvan de onbeschikbaarheid werd gemeld aan het FAGG en bekendgemaakt is op hun website *farmastatus.be* substitueren zonder voorafgaand akkoord van de voorschrijver. Met “onbeschikbaarheid” wordt bedoeld: de geneesmiddelen die tijdelijk onbeschikbaar zijn (symbool op onze website) en de geneesmiddelen waarvan de commercialisering definitief is stopgezet. Er zijn een aantal uitzonderingen. Voor meer informatie, zie *Folia oktober 2022*.

### INL. 2.11.15. Invoer van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn en geneesmiddelen met een “derogatie”

**Geneesmiddelen waarvoor de artsenverklaring verplicht is**



Een geneesmiddel dat niet (meer) of tijdelijk niet op de Belgische markt beschikbaar is en waarvoor de firma niet beschikt over een derogatie (zie verder), mag ingevoerd worden uit het buitenland, tenzij het geneesmiddel is geschorst of verboden om redenen van volksgezondheid.

De kostprijs kan voor de patiënt echter veel hoger zijn, en de arts en apotheker brengen de patiënt hiervan best vooraf op de hoogte.

- **Procedure voor de arts**
  - De voorschrijver moet **een voorschrift op naam** van de patiënt opstellen en verklaren dat de patiënt niet adequaat kan behandeld worden met de in België beschikbare geneesmiddelen. Dit moet via een apart document: **de Artsenverklaring**. Deze kan worden uitgeschreven voor een behandelingsduur van maximum 1 jaar.
  - De artsenverklaring moet ook opgesteld worden voor de invoer in geval van onbeschikbaarheid van een vergund middel, ook al spreekt het document enkel over 'geen vergunning hebben' (de tekst van de artsenverklaring moet niet aangepast worden door de voorschrijver).
  - Het geneesmiddel mag op specialiteitsnaam of op stofnaam worden voorgeschreven.
- **Procedure voor de apotheker**
  - De apotheker mag de buitenlandse specialiteit (die in dat land vergund is) slechts afleveren indien hij beschikt over het voorschrift en de artsenverklaring. De artsenverklaring moet tien jaar worden bewaard.
  - Voor verdovende middelen en psychotrope stoffen is bovendien een invoervergunning nodig die door de apotheker voorafgaandelijk moet worden aangevraagd bij het *team Verdovende Middelen van het FAGG*; bij de aanvraag moet een kopie van de artsenverklaring worden voorgelegd.
  - In een voor het publiek opengestelde officina mag de apotheker enkel een stock aanleggen in functie van de voorziene behandelingsduur van de betrokken patiënt (max. 1 jaar). Een ziekenhuisapotheker kan, op basis van een schriftelijk verzoek en artsenverklaring, wel een reserve aanleggen voor een groep patiënten die onder de verantwoordelijkheid van de gespecialiseerde arts vallen.
- **Terugbetaling**
  - Meestal is er geen terugbetaling voorzien.
  - Een essentieel geneesmiddel voor een zeldzame aandoening, waarvoor er in België geen enkel alternatief vergund is, kan opgenomen worden in hoofdstuk IVbis: dit laat terugbetaling toe, onder bepaalde voorwaarden, na akkoord van de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling. Een actuele versie van de lijst kan geraadpleegd worden via de *website van het RIZIV*. Voor meer details over hoofdstuk IVbis, klik *hier*.

#### **Geneesmiddelen met een “derogatie”**

In geval van onbeschikbaarheid van een in België vergund geneesmiddel, kan het FAGG aan de firma een derogatie toestaan om het middel in te voeren uit het buitenland en in de handel te brengen, dit gedurende achtereenvolgende periodes van maximum 2 jaar. Indien de derogatie wordt toegekend, blijven de vergoedingsmodaliteiten van de Belgische specialiteit van toepassing voor het ingevoerde product. De firma staat steeds in voor de transportkosten. De geneesmiddelen met een derogatie zijn te vinden via *farmastatus.be* > Onbeschikbare geneesmiddelen: ga naar de volledige lijst > kies “Invoer door de firma mogelijk” in het veld “Impact”. De geneesmiddelen waarvoor de firma een derogatie heeft verkregen, worden op onze website aangeduid met het symbool .

### **INL. 2.11.16. De prijzen, “afleveromgevingen”, vermelding “H.G.” en vermelding van de terugbetalingscategorieën en -voorwaarden in het Repertorium**

#### **INL. 2.11.16.1. Prijzen**

De vermelde **kostprijs** is de maximale publieksprijs zoals bepaald door de FOD Economie.

Bij de hospitaalgeneesmiddelen (symbool “H.G.”) wordt een *benaderende prijs* per verpakking vermeld. Het gaat om de “prijs buiten bedrijf” + 6% btw. Om de aandacht erop te vestigen dat deze prijs slechts benaderend is, wordt



deze vermeld tussen vierkante haakjes en in cursief lettertype. De prijs die effectief wordt aangerekend aan de patiënt en het RIZIV hangt af van verschillende factoren (bv. geneesmiddel binnen of buiten het forfait). Met het vermelden van deze benaderende prijs wil het BCFI de voorschrijver en apotheker informeren en sensibiliseren over de soms zeer hoge kostprijs van bepaalde hospitaalgeneesmiddelen.

### **INL. 2.11.16.2. De afleveromgevingen “publiek”, “hospitaal”, “ambulant” en “ROB/RVT”**

Via een uitvallijst in de navigatiebalk van het Repertorium bovenaan rechts kunt u kiezen voor 4 “afleveromgevingen”:

- **“publiek” (P):** voor de prijzen en terugbetalingsmodaliteiten van toepassing in de publieke officina. Voor de specialiteiten H.G. (zie *Inl.2.11.16.3.*) worden in deze afleveromgeving alleen de kleinste verpakkingen vermeld en kunnen geen terugbetalingsmodaliteiten worden geraadpleegd.
- **“hospitaal (ZH)” (H):** voor de prijzen en terugbetalingsmodaliteiten van toepassing op gehospitaliseerde patiënten. Voor de specialiteiten H.G. (zie *Inl.2.11.16.3.*) worden alle verpakkingen vermeld en kunnen de terugbetalingsvoorwaarden worden geraadpleegd.
- **“ambulant (ZH)” (A):** voor de prijzen en terugbetalingsmodaliteiten van toepassing voor ambulante zorg in het ziekenhuis. Voor de specialiteiten H.G. (zie *Inl.2.11.16.3.*) worden alle verpakkingen vermeld en kunnen de terugbetalingsvoorwaarden worden geraadpleegd.
- **“ROB/RVT” (R):** voor de prijzen en terugbetalingsmodaliteiten van toepassing voor ouderen in een woonzorgcentrum. Voor de specialiteiten H.G. (zie *Inl.2.11.16.3.*) worden alle verpakkingen vermeld.

Zie ook bericht in de rubriek “Goed om te weten” van 20/06/2019.

### **INL. 2.11.16.3. Vermelding “H.G.” (hospitaalgebruik)**

“H.G.” (hospitaalgebruik) betekent dat de specialiteit geen publieksprijs heeft en in principe alleen in het ziekenhuis wordt gebruikt. Sommige van deze geneesmiddelen mogen enkel afgeleverd worden via een ziekenhuisapothek. De vermelding H.G. geeft evenwel geen aanduiding of de specialiteit al dan niet in een publieke officina kan afgeleverd worden. Voor deze informatie verwijzen we naar de *SAM viewer* (zoeken op merknaam en dan > Admin > Bijzondere aflevermodaliteiten).

#### **Welke verpakkingen van de specialiteiten H.G. worden vermeld op onze website?**

- Afleveromgeving “publiek”: alleen de kleinste verpakking.
- Afleveromgevingen “hospitaal (ZH)”, ambulant (ZH) en ROB/RVT: alle verpakkingen.

#### **Hoe de terugbetalingsmodaliteiten van de specialiteiten H.G. op onze website consulteren?**

Selecteer de afleveromgevingen “hospitaal (ZH)” of “ambulant (ZH)”.

In verband met de “afleveromgevingen”, zie *Inl.2.11.16.2.*

### **INL. 2.11.16.4. De vermelding van de terugbetalingscategorieën en terugbetalingsvoorwaarden in het Repertorium**

In het Repertorium wordt voor elke terugbetaalbare verpakking de terugbetalingscategorie vermeld.

- Er bestaan voor specialiteiten 7 terugbetalingscategorieën: A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb (zie *Inl.5.* voor meer uitleg). In de hoofdstukken van het Repertorium worden om typografische redenen de kleine letters a, b, c gebruikt.
- Voor de geneesmiddelen voor hospitaalgebruik, aangeduid met “H.G.”, wordt de terugbetalingscategorie enkel vermeld in de afleveromgevingen “ziekenhuis (ZH)” en “ambulant (ZH)” (zie *Inl.2.11.16.2.*).
- De terugbetalingscategorieën Fa en Fb worden voorlopig alleen in ziekenhuismilieu gebruikt en worden in het Repertorium enkel vermeld in de afleveromgevingen “ziekenhuis (ZH)” en “ambulant (ZH)” (zie *Inl.2.11.16.2.*).

Bij het aanwijzen van de terugbetalingscategorie ziet men o.a. het remgeld, of de terugbetaling tijdelijk is (art. 111), en of de specialiteit al dan niet opgenomen is in het ziekenhuisforfait.

In het Repertorium kan de letter die de terugbetalingscategorie aanduidt:

- gevolgd zijn door het **teken** <sup>†</sup> : terugbetaling in hoofdstuk IV of VIII, d.w.z. slechts na akkoord van de



adviserend arts van de verzekeringsinstelling (*a priori* controle); voor sommige van deze specialiteiten volstaat het dat de behandelende arts op het voorschrift de vermelding “derdebetalersregeling van toepassing” aanbrengt”

- gevolgd zijn door het **teken** <sup>†</sup> : terugbetaling in hoofdstuk II, d.w.z. zonder voorafgaand akkoord van de adviserend arts, maar met mogelijkheid van *a posteriori* controle;
- vervangen of gevolgd zijn door de **letter J**:
  - Voor anticonceptiva betekent dit dat er speciale tegemoetkoming (met een bedrag van maximum 3 euro per maand) is in de prijs bij personen jonger dan 25 jaar en, ongeacht hun leeftijd, bij personen die in aanmerking komen voor “*verhoogde tegemoetkoming*”. Voor meer details, zie *website RIZIV*.
  - Voor de *morning after pill* betekent de letter J dat er speciale tegemoetkoming (met een bedrag van maximum 9 euro per doosje) is bij alle personen, ongeacht de leeftijd. Voor meer details, zie *website RIZIV*.
- vervangen of gevolgd zijn door de **letters al**:
  - Voor anticonceptiva betekent dit dat het anticonceptivum gratis is bij personen jonger dan 25 jaar en, ongeacht hun leeftijd, bij personen die in aanmerking komen voor “*verhoogde tegemoetkoming*”. Voor meer details, zie *website RIZIV*.
  - Voor de *morning after pill* betekenen de letters al dat de specialiteit gratis is bij alle personen, ongeacht de leeftijd. Voor meer details, zie *website RIZIV*.
- vervangen zijn door de **letter h**: terugbetaling slechts in hospitaalmilieu.

Door aanklikken van het symbool <sup>†</sup> of <sup>†</sup> kunnen de terugbetalingsvoorwaarden vastgelegd door het RIZIV voor de geneesmiddelen terugbetaald in hoofdstuk II, IV of VIII opgeroepen worden. Voor de terugbetalingsvoorwaarden van de H.G. geneesmiddelen: ga naar de afleveromgevingen “hospitaal (ZH)” of “ambulant” (zie *Inl.2.11.16.2*). Men vindt op hetzelfde scherm een link naar het reglementair aanvraagformulier voor terugbetaling, voor zoverre dit voorzien is door het RIZIV. De meeste medische softwarepakketten laten toe om elektronisch hoofdstuk IV- en hoofdstuk VIII-aanvragen in te dienen via CIVARS of geïntegreerd in hun eigen artsen-softwarepakket; voor de meeste farmaceutische specialiteiten die uitsluitend vergoedbaar zijn in ziekenhuismilieu geldt zelfs een verplichte elektronische aanvraagprocedure.

## **INL. 2.12. Symbolen gebruikt ter hoogte van de specialiteiten in het Repertorium**

**Voorschrift (zie ook *Inl.4*.)**

R/ Medisch voorschrift vereist

(R/) Medisch voorschrift of “op schriftelijke aanvraag van de patiënt”

### **Terugbetaling**

a, b, c, cs, cx, Fa, Fb: voor meer uitleg over deze terugbetalingscategorieën, zie *Inl.5*.

<sup>†</sup> Terugbetaling in hoofdstuk IV of VIII, d.w.z. mits akkoord van de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling, ofwel via *a priori* controle, ofwel voor sommige geneesmiddelen mits vermelding “derdebetalersregeling van toepassing (zie *Inl.2.11.16.4*).

<sup>†</sup> Terugbetaling in hoofdstuk II, d.w.z. zonder voorafgaand akkoord van de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling, maar met *a posteriori* controle (zie *Inl.2.11.16.4*).

J en al Speciale tegemoetkoming van het RIZIV voor de anticonceptiva en de *morning after pill* (zie *Inl.2.11.16.4*.)

h Terugbetaling slechts in kliniekverband (zie *Inl.2.11.16.4*.)

T Tijdelijke terugbetaling (art. 111), gebaseerd op een overeenkomst tussen het farmaceutisch bedrijf en de



overheid. De tijdelijke terugbetaling kan maximum gedurende 3 jaar worden toegekend met mogelijke verlengingen na tussentijdse evaluaties. Voor de patiënt is er geen direct gevolg van het feit dat een geneesmiddel slechts “tijdelijk” wordt vergoed, maar de vergoeding kan gestopt worden.

☞ “Goedkoop geneesmiddel” (voor meer uitleg zie *Inl.5.*)

○ Geneesmiddel dat niet behoort tot de “goedkope” geneesmiddelen (voor meer uitleg zie *Inl.5.*)

### Geneesmiddelenbewaking

▼ Geneesmiddel waarvoor bijzondere aandacht wordt gevraagd i.v.m. ongewenste effecten (voor meer uitleg zie *Inl.6.2.1.*)

▼ Geneesmiddel waarvoor bijkomende “risicobeperkende activiteiten” vereist zijn (voor meer uitleg zie *Inl.6.2.1.*)

### Doping

① Product vallend onder de WADA-lijst van verboden substanties in de sport (voor meer uitleg zie *Inl.2.11.11.*)

② Product dat niet verboden is, maar dat bij dopingcontrole een positief resultaat kan geven (voor meer uitleg zie *Inl.2.11.11.*)

### Nierinsufficiëntie

👉 Dosisreductie of contra-indicatie bij ernstige nierinsufficiëntie (voor meer uitleg zie *Inl.2.4.*)

👉 Dosisreductie of contra-indicatie reeds bij matige nierinsufficiëntie (voor meer uitleg zie *Inl.2.4.*)

### Onbeschikbaarheden

Tijdelijk onbeschikbaar (voor meer uitleg zie *Inl.2.11.14.*)

Geneesmiddel waarvoor de firma een derogatie heeft verkregen (zie *Inl.2.11.15.*).

### SKP en bijsluiter

Link naar de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP). In hetzelfde document ook de bijsluiter voor het publiek voor de “centraal vergunde” geneesmiddelen. Zie *Inl.2.11.13.*

Link naar de bijsluiter voor het publiek (enkel voor de nationaal vergunde geneesmiddelen en de geneesmiddelen vergund via de decentrale/wederzijdse-erkenning procedure). Zie *Inl.2.11.13.*

### Varia

link naar weergave per groepsnaam / prijzen vergelijken (zie *Inl.2.11.4.*)

Selectie in het Formularium Ouderenzorg: voor meer informatie over geneesmiddelen voor ouderen (80+), zie <https://www.bcfi.be/nl/olderadultsmeds>

## INL. 2.13. Afkortingen gebruikt in de publicaties van het BCFI

Een aantal termen worden uitgelegd in *Inl.2.11.7.*

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ademgest. = <i>ademgestuurd</i> | IR = <i>reactiviteitsindex</i>  |
| alc. = <i>alcoholisch</i>       | i.thec. = <i>intrathecaal</i>   |
| amp. = <i>ampul</i>             | i.tumor. = <i>intratumoraal</i> |
| anti-Xa = <i>anti-factor Xa</i> | i.uter. = <i>intra-uterien</i>  |
| applic. = <i>applicator</i>     | i.v. = <i>intraveneus</i>       |



|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| auric. = <i>auriculair</i>               | i.ventr. = <i>intraventriculair</i>                        |
| bew. = <i>bewaarmiddel</i>               | i.vesic. = <i>intravesicaal</i>                            |
| bruisgran. = <i>bruisgranulaat</i>       | i.vitr. = <i>intravitreaal</i>                             |
| bruispdr. = <i>bruispoeder</i>           | KIE = <i>kallidinogenase-inactivatoreenheid</i>            |
| bruistabl. = <i>bruistablet</i>          | KVE = <i>kolonie vormende eenheden</i>                     |
| bucc. = <i>buccaal</i>                   | laryngofar. = <i>laryngofaryngeaal</i>                     |
| caps. = <i>capsule</i>                   | lok. = <i>lokaal</i>                                       |
| conc. = <i>concentraat</i>               | m. = <i>maand</i>                                          |
| cut. = <i>cutaan</i>                     | maagsapresist. = <i>maagsapresistent</i>                   |
| deelb. = <i>deelbaar</i>                 | max. = <i>maximum</i>                                      |
| dent. = <i>dentaal</i>                   | medic. = <i>medicinaal</i>                                 |
| disp. = <i>dispergeerbaar</i>            | mEq. = <i>milli-equivalent</i>                             |
| dos. = <i>dosis</i>                      | (M)(I)E = <i>(miljoen) (internationale) eenheid</i>        |
| dr. = <i>druppel</i>                     | nas. = <i>nasaal</i>                                       |
| drinkb. = <i>drinkbaar</i>               | ocul. = <i>oculair</i>                                     |
| druppelfl. = <i>druppelfles</i>          | omh. = <i>omhuld</i>                                       |
| emuls. = <i>emulsie</i>                  | opl(oss). = <i>oplossing</i>                               |
| endocerv. = <i>endocervicaal</i>         | oplosb. = <i>oplosbaar</i>                                 |
| endotrach. = <i>endotracheopulmonair</i> | or. = <i>oraal</i>                                         |
| epidur. = <i>epiduraal</i>               | orodisp. = <i>orodispergeerbaar</i>                        |
| epilaes. = <i>epilaesionaal</i>          | orofar. = <i>orofaryngeaal</i>                             |
| eq. = <i>equivalent</i>                  | oromuc. = <i>oromucosaal</i>                               |
| filmomh. = <i>filmomhuld</i>             | p.artic. = <i>peri-articulair</i>                          |
| flac. = <i>flacon</i>                    | patr. = <i>patroon</i>                                     |
| gastr. = <i>gastrisch</i>                | p.d. = <i>per dag</i>                                      |
| gastro-ent. = <i>gastro-enteraal</i>     | pdr. = <i>poeder</i>                                       |
| geïmpr. = <i>geïmpregneerd</i>           | p.neur. = <i>perineuraal</i>                               |
| geregul. = <i>gereguleerd</i>            | p.odont. = <i>peri-odontaal</i>                            |
| gingiv. = <i>gingivaal</i>               | ppm = <i>deeltjes per miljoen</i>                          |
| glob. = <i>globule</i>                   | rect. = <i>rectaal</i>                                     |
| gran. = <i>granulaat</i>                 | s.c. = <i>subcutaan</i>                                    |
| H.G. = <i>hospitaalgebruik</i>           | s.conj. = <i>subconjunctivaal</i>                          |
| i.arter. = <i>intra-arterieel</i>        | SKP = <i>Samenvatting van de Kenmerken van het Product</i> |
| i.artic. = <i>intra-articulair</i>       | s.mucos. = <i>submucosaal</i>                              |



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i.burs. = <i>intra-bursaal</i>      | solv. = <i>solvent</i>                                                                               |
| i.camer. = <i>intracameraal</i>     | SQ-Bet = <i>eenheid specifiek voor het allergeenextract Itulazax®</i>                                |
| i.card. = <i>intracardiaal</i>      | SQ-HDM = <i>eenheid specifiek voor het allergeenextract Acarizax®</i>                                |
| i.cavern. = <i>intracaverneus</i>   | SQ-T = <i>eenheid specifiek voor het allergeenextract Grazax®</i>                                    |
| i.cistern. = <i>intracisternaal</i> | SQ-U = <i>eenheid specifiek voor het allergeenextract Alutard SQ®</i>                                |
| i.derm. = <i>intradermaal</i>       | s.retin. = <i>subretinaal</i>                                                                        |
| i.gland. = <i>intraglandulair</i>   | subling. = <i>sublinguaal</i>                                                                        |
| i.laes. = <i>intralesionaal</i>     | susp. = <i>suspensie</i>                                                                             |
| i.m. = <i>intramusculair</i>        | tabl. = <i>tablet</i>                                                                                |
| inf. = <i>infusie</i>               | TE = <i>tuberculine eenheid</i> (in de prijsvergelijkingstabellen betekent TE = tarifieringseenheid) |
| infiltr. = <i>infiltratie</i>       | TMF = <i>Therapeutisch Magistraal Formularium</i>                                                    |
| inhal. = <i>inhalatie</i>           | transderm. = <i>transdermaal</i>                                                                     |
| inj. = <i>injectie</i>              | urethr. = <i>urethraal</i>                                                                           |
| instill. = <i>instillatie</i>       | vag. = <i>vaginaal</i>                                                                               |
| i.ocul. = <i>intra-oculair</i>      | verl. = <i>verlengde</i>                                                                             |
| i.oss. = <i>intra-ossaal</i>        | vg = <i>vectorgenoom</i>                                                                             |
| i.perit. = <i>intraperitoneaal</i>  | vloeist. = <i>vloeistof</i>                                                                          |
| i.pleur. = <i>intrapleuraal</i>     | voorgev. = <i>voorgevulde</i>                                                                        |
| i.putam. = <i>intraputaminaal</i>   | vrijst. = <i>vrijstelling</i>                                                                        |

### INL. 3. Generieken, biosimilars en voorschrijven op stofnaam

- De term "**generisch geneesmiddel**" is voor België wettelijk duidelijk omschreven. Een generisch geneesmiddel moet (1) hetzelfde actieve bestanddeel en dezelfde sterkte per eenheid bevatten als het referentiemiddel (d.w.z. chemisch equivalent zijn), (2) dezelfde farmaceutische vorm en toedieningsweg hebben, en (3) een gelijkwaardige biologische beschikbaarheid (d.w.z. hetzelfde plasmaconcentratie-tijdsprofiel) hebben als deze van het referentiemiddel (d.w.z. dat ze bio-equivalent zijn). Bio-equivalentie betekent in principe therapeutische equivalentie. *Zie ook Folia april 2012.*
- Een **biosimilar** is een biologisch geneesmiddel waarvan aangetoond is dat het "therapeutisch gelijkwaardig" is aan een biologisch referentieproduct. De benadering zoals voor generische geneesmiddelen waarbij therapeutische equivalentie wordt aangetoond door middel van bio-equivalentiestudies, is hier niet van toepassing. Het aantonen van **therapeutische** gelijkwaardigheid tussen een biosimilar en zijn referentieproduct berust op bijkomende klinische direct vergelijkende gegevens die tonen dat de werkzaamheid en veiligheid van de twee producten gelijk zijn. Biologische geneesmiddelen hebben doorgaans een complexere structuur dan chemisch gesynthetiseerde moleculen, en een zekere variabiliteit van de structuur van het actieve bestanddeel is mogelijk. Voor biosimilars



gelden dezelfde eisen inzake geneesmiddelenbewaking als voor de biologische geneesmiddelen in het algemeen, met immunogeniteit als aandachtspunt [zie *Folia april 2014*].

- **Overschakelen van de ene specialiteit naar de andere**
  - Originele specialiteiten en generieken met hetzelfde actieve bestanddeel en met dezelfde sterkte en farmaceutische vorm, zijn meestal zonder problemen onderling uitwisselbaar. Overschakelen kan echter bij patiënten op chronische medicatie tot verwarring leiden omwille van de andere benaming, kleur of smaak. Bij het overschakelen van de ene specialiteit naar de andere hebben de arts en de apotheker een belangrijke rol in het informeren en opvolgen van de patiënt om een correcte inname te garanderen. Zo kan vermeden worden dat de patiënt bijvoorbeeld eenzelfde geneesmiddel tweemaal inneemt onder verschillende benamingen.
  - **Er zijn situaties waarbij overschakelen van de ene specialiteit naar de andere tijdens een chronische behandeling beter niet gebeurt of zeer voorzichtig moet gebeuren**, bijvoorbeeld wanneer het een geneesmiddel met een nauwe therapeutisch-toxische marge betreft (zie *Inl.6.2*). Het FAGG raadt voor volgende geneesmiddelen af om zomaar over te schakelen van de ene specialiteit naar de andere: geneesmiddel met een nauwe therapeutisch-toxische marge, oncologische geneesmiddelen, anti-epileptica, transdermale preparaten, producten voor lokale toepassing, inhalatiegeneesmiddelen, orale anticonceptiva, mesalazine [zie [https://www.fagg.be/sites/default/files/NOTA\\_VOS\\_2023\\_DEF.pdf](https://www.fagg.be/sites/default/files/NOTA_VOS_2023_DEF.pdf) (07/07/2023)]. Deze specialiteiten hebben de vermelding “no switch” ter hoogte van de groepsnaam.
  - **Ook hulpstoffen (bv. bepaalde kleurstoffen of bewaarmiddelen, ethanol, aspartaam, gluten) kunnen een probleem stellen bij het overschakelen: het gaat om de zogenaamde “hulpstoffen met erkende werking”**: zie *Inl.2.11.6*.
  - Het EMA stelt dat een biosimilar uitwisselbaar is met zowel het referentieproduct als met een andere biosimilar van hetzelfde referentieproduct (EMA, 19/09/2022). Biosimilars van eenzelfde referentieproduct zijn niet direct met elkaar vergeleken, waardoor waakzaamheid in verband met ongewenste immunogeniciteit geboden blijft [*Geneesmiddelenbulletin 2022*;56:101-4].
- Voor een **voorschrift op stofnaam (VOS)** dient, naast de gebruikelijke administratieve gegevens, het volgende te worden vermeld: de stofnaam (“Algemene Internationale Benaming”) van het actieve bestanddeel of de actieve bestanddelen, de farmaceutische vorm of toedieningsweg, de sterkte, de dagdosis en de behandelingsduur in weken en/of dagen [[www.riziv.fgov.be](http://www.riziv.fgov.be)]. De VOS-nota met voorschrijfgeregels is beschikbaar via de FAGG-website: [https://www.fagg.be/sites/default/files/NOTA\\_VOS\\_2023\\_DEF.pdf](https://www.fagg.be/sites/default/files/NOTA_VOS_2023_DEF.pdf) (07/07/2023). De nota bevat onder andere de lijst van geneesmiddelen waarvoor het FAGG voorschrijven op stofnaam afraadt (“no VOS”) en de lijst van geneesmiddelen waarvoor overschakeling van de ene specialiteit naar de andere best vermeden wordt (“no switch”). De vermeldingen “no VOS” en “no switch” worden in het Repertorium, waar van toepassing, vermeld in de prijsvergelijkingstabellen (weergave “per groepsnaam”).

## INL. 4. Het voorschrift

Zonder bijkomende vermelding van de voorschrijver is een voorschrift 3 maanden geldig na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als voor terugbetaling. Dit geldt zowel voor elektronische als voor papieren voorschriften. De voorschrijver kan door het vermelden van een “einddatum van de uitvoerbaarheid” in het daarvoor voorziene veld op het voorschrift een kortere of langere geldigheidstermijn bepalen, maar de einddatum kan nooit later zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum [zie *Folia oktober 2019*].

Er wordt slechts 1 verpakking van een specialiteit terugbetaald per voorschrift (uitzonderingen: insuline, pancreasenzymen...). In geval van een geldig VOS-voorschrift (zie *Inl.3*) mogen echter wel verschillende verpakkingen terugbetaald worden per voorschrift, voor zover het totaal aantal eenheden de vermelde behandelingsduur (maximum 3 maanden) niet overschrijdt.



## INL. 5. Terugbetalingsmodaliteiten en de begrippen “goedkoop voorschrijven” en “afleveren van een specialiteit die behoort tot de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen”

Er bestaan voor specialiteiten **7 terugbetalingscategorieën**: A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb. De toegekende RIZIV-terugbetalingscategorie geeft aan in welke mate de verplichte verzekering tussenkomt in de kosten.

- Categorie A (volledige terugbetaling) omvat “de levensnoodzakelijke specialiteiten”.
- Categorie B (grotendeels terugbetaald) omvat de “therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten”.
- Categorie C (slechts gedeeltelijk terugbetaald, in afnemende mate van C over Cs tot Cx) omvat de “geneesmiddelen bestemd voor symptomatische behandeling”.
- Categorieën Fa en Fb duiden geneesmiddelen aan waarvoor een forfaitair bedrag voorzien is voor terugbetaling. Fa en Fb terugbetalingscategorieën worden voorlopig alleen in ziekenhuismilieu gebruikt.

Soms verschilt de terugbetaling van een bepaalde specialiteit naargelang de indicatie.

Meer informatie over de verschillende “hoofdstukken” waarin een geneesmiddel kan worden terugbetaald en over de *a priori* en de *a posteriori* controle is te vinden op de website van het RIZIV ([www.riziv.fgov.be](http://www.riziv.fgov.be)). De terugbetalingsvoorwaarden vastgelegd door het RIZIV voor de geneesmiddelen terugbetaald in hoofdstuk II, IV of VIII kunnen opgeroepen worden door aanklikken van het symbool  of  ter hoogte van de specialiteit in het Repertorium (zie Inl.2.11.16.4.).

Het persoonlijk aandeel van de patiënt (remgeld) wordt berekend op basis van de “vergoedingsbasis niveau buiten bedrijf”. Het remgeldplafond is het maximumbedrag dat een patiënt aan remgeld betaalt voor een geneesmiddel terugbetaald in categorie B of C. In de tabel hieronder worden de remgeldplafonds getoond die gelden op 1 januari 2024.

**Tabel Ia. Remgeldplafonds**

| Terugbetalingscategorie  | Gewoon verzekerden | Verhoogde tegemoetkoming* |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| A                        | Geen remgeld       | Geen remgeld              |
| B                        | € 12,10            | € 8,00                    |
| B - grote verpakkingen** | € 15               | € 9,90                    |
| C                        | € 15               | € 9,90                    |
| Cs en Cx                 | Geen plafond       | Geen plafond              |

\* Voor informatie betreffende “verhoogde tegemoetkoming”, zie *website RIZIV*

\*\* Onder “grote verpakking” wordt hier verstaan elke publieksverpakking die meer dan 60 gebruikseenheden bevat. Onder “gebruikseenheid” wordt verstaan de unidosi of, in geval van multidosi, de standaardeenheid zijnde 1 g, 1 ml of 1 dosi.

Voor sommige categorieën patiënten (bv. mensen met een laag inkomen, chronisch zieken...) geldt een **maximumfactuur** (MAF). Dit betekent dat voor deze patiënten en hun gezin de persoonlijke tussenkomst voor prestaties die door het RIZIV worden terugbetaald (o.a. terugbetaalbare geneesmiddelen), tot een maximum jaarlijks bedrag wordt beperkt. Van zodra het plafond is overschreden dienen deze patiënten geen persoonlijk aandeel meer te betalen voor terugbetaalbare geneesmiddelen van categorie A, B of C alsook voor het griepvaccin afgeleverd in een openbare apotheek. Meer informatie over de maximumfactuur vindt u via [www.riziv.fgov.be](http://www.riziv.fgov.be) (zoekterm: MAF).

Bepaalde **magistrale bereidingen** worden terugbetaald door het RIZIV. Voor details, zie *website RIZIV*.

Voor **gehospitaliseerde patiënten** is de persoonlijke tussenkomst voor terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten forfaitair vastgelegd op € 0,62 per hospitalisatiedag.

**Tarifieren per eenheid.** Voor **patiënten die in een woonzorgcentrum verblijven**, moeten in openbare apotheken



sinds 1 april 2015 terugbetaalbare specialiteiten in orale vaste vorm verplicht per eenheid (bv. per tablet) worden getarifeerd. Het afleveren van geneesmiddelen per eenheid is niet verplicht. Voor de arts verandert dit niets: het klassieke medicatievoorschrift blijft van toepassing. De tarifiering per eenheid vereist de vermelding van de dosering op het voorschrift en ook de duur van de behandeling. [Zie *website RIZIV*, *Inl.2.11.4.* en *Folia april 2015*]

**De begrippen “goedkoop voorschrijven” (belangrijk voor de voorschrijver) en “afleveren van een specialiteit die behoort tot de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen” (belangrijk voor de apotheker).**

- **De voorschrijver** wordt aangemoedigd om **“goedkoop voor te schrijven”**. Hij/zij kan dit doen door ofwel een “goedkoop” geneesmiddel” voor te schrijven (deze geneesmiddelen worden in het Repertorium aangeduid met het symbool  ) ofwel door het op stofnaam voorschrijven van een geneesmiddel dat opgenomen is in het referentietrugbetalingssysteem. Voor meer informatie: zie *RIZIV-website*.
- **De apotheker** moet voor voorschriften op stofnaam (zie *Inl.3.*) en voor antibiotica of antimycotica voorgeschreven voor de behandeling van een acute aandoening, een specialiteit afleveren die behoort tot de **“goedkoopste” geneesmiddelen**. De “goedkoopste geneesmiddelen” worden met een lichtgroene achtergrond weergegeven op de website van het BCFI. Voor meer informatie: zie *RIZIV-website*, zoek op “antibiotica-antimycotica-regels” of op “goedkoopste geneesmiddel”.
- **Nota.** In het Repertorium zijn er ook geneesmiddelen die aangeduid zijn met het symbool  : dit zijn geneesmiddelen die niet behoren tot de categorie “goedkope” geneesmiddelen.

## INL. 6. Goed en veilig gebruik van geneesmiddelen

Goed gebruik van een geneesmiddel houdt in dat de medicatieveiligheid wordt bewaakt, met oog voor de 5 J's

- Juiste patiënt
- Juiste geneesmiddel
- Juiste dosis
- Juiste toedieningsweg
- Juiste toedieningsmoment.

### INL. 6.1. Doseringsaanpassing

De dosering van de meeste geneesmiddelen moet individueel worden aangepast onder meer in functie van leeftijd, ziekte-toestanden (nier- en leverinsufficiëntie) en soms van genetische aanleg. Ook bij andere ziekte-toestanden dan nier- en leverinsufficiëntie, bv. hartfalen, kan doseringsaanpassing nodig zijn, maar algemene regels zijn in dit verband niet te geven.

#### INL. 6.1.1. Leeftijd

- **Kinderen:**
  - Bij de pasgeborene gebeuren afbraak en uitscheiding van geneesmiddelen zeer traag, maar normaliseren meestal binnen de eerste maanden.
  - De gevoeligheid van de eindorganen kan bij het jonge kind sterk verschillen van deze bij volwassenen.
  - Berekenen van de dosering voor kinderen:
    - Er bestaan geen goede formules voor het berekenen van de **dosering** aan de hand van de dosering voor volwassenen.
    - Het berekenen van de dosering op basis van het gewicht van het kind geeft een betere benadering dan op basis van de leeftijd van het kind, maar voorzichtigheid blijft geboden aangezien geen rekening wordt gehouden met bv. de maturiteit van de enzymen en organen.
    - Voor sommige, vooral oncologische geneesmiddelen wordt de lichaamsoppervlakte gebruikt.
  - De dosering voor kinderen wordt in dit Repertorium alleen vermeld voor geneesmiddelen die frequent bij deze leeftijdsgroep worden gebruikt.
  - Bronnen voor doseringen bij kinderen: SKP, *kinderformularium.nl* (website Nederland, vrij te



consulteren), *British National Formulary (BNF) for children* (Verenigd Koninkrijk, betalend).

- **Ouderen:**
  - De gevoeligheid van de eindorganen verandert en neemt meestal toe.
  - Ook de dispositie van de geneesmiddelen verandert bij ouderen: er is voor vele middelen een vertraagde afbraak (meestal pas klinisch relevant bij bestaan van levercirrose), maar meest opvallend is de verminderde renale excretie (zie *Inl.6.1.2.*).

### INL. 6.1.2. Nierinsufficiëntie

- Bij patiënten met nierinsufficiëntie kunnen veranderingen optreden in de farmacokinetiek, maar ook in de gevoeligheid van de eindorganen.
- Men moet vooral letten op de **verminderde renale excretie van geneesmiddelen**. Dit kan leiden tot verhoogde toxiciteit, zeker wanneer het geneesmiddel (of zijn actieve metaboliet(en)) helemaal of grotendeels via de urine wordt uitgescheiden en een nauwe therapeutisch-toxische marge (zie *Inl.6.2.*).
- Het is belangrijk om rekening te houden met de nierfunctie bij het bepalen van de dosering van (voornamelijk renaal geklaarde) geneesmiddelen. Een overzichtartikel over verminderde nierfunctie en geneesmiddelen verscheen in *Geneesmiddelenbulletin 2023;57(10):e2023.10.17*.
- Meting van de nierfunctie [La Revue Prescrire 2020;40:515-21; *Geneesmiddelenbulletin 2023;57(10):e2023.10.17*]
  - Er zijn verschillende formules om de nierfunctie te schatten, zoals Cockcroft-Gault, MDRD (*Modification of Diet in Renal Diseases*) en CKD-EPI (*Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration*).
    - De formule van Cockcroft-Gault werd klassiek gebruikt maar is nu verlaten.
    - Meer en meer wordt de CKD-EPI-formule gebruikt.
  - De formules baseren zich onder andere op de creatininemie. Het serumcreatinine is bij ouderen, niettegenstaande de ingekrompen nierfunctie, dikwijls misleidend normaal, wegens een verminderde creatinineproductie ten gevolge van de verminderde spiermassa. Vandaar dat wordt gecorrigeerd voor de leeftijd in de formules.
  - De formules hebben allemaal hun beperkingen.
- **In het Repertorium wordt bij nierinsufficiëntie een onderscheid gemaakt tussen**
  - “**lichte nierinsufficiëntie**” voor een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 60 tot 90 mL/min/1,73m<sup>2</sup>.
  - “**matige nierinsufficiëntie**” voor een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 30 tot 60 mL/min/1,73m<sup>2</sup>.
  - “**ernstige nierinsufficiëntie**” voor een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 15 tot 30 mL/min/1,73m<sup>2</sup>.
  - “nierfalen of ESRD (*End Stage Renal Disease*)” voor een creatinineklaring van minder dan 15 mL/min/1,73m<sup>2</sup>
- In verband met de niersymbolen ter hoogte van de specialiteiten en de melding van contra-indicatie of nood aan dosisreductie bij nierinsufficiëntie in het Repertorium, zie *Inl.2.4.* en *Inl.2.9.*

### INL. 6.1.3. Leverinsufficiëntie

- Bij leverlijden kunnen zowel de farmacokinetiek als de farmacodynamiek van een geneesmiddel gewijzigd zijn, maar de graad daarvan is moeilijk voorspelbaar. De lever heeft een grote overcapaciteit om geneesmiddelen te metaboliseren, en men neemt aan dat dosisaanpassing pas noodzakelijk is wanneer een chronische leverziekte gevorderd is tot cirrose.
- Belangrijke farmacokinetische veranderingen als gevolg van levercirrose zijn een verminderd eerstestap-effect en verlengde halfwaardetijd door een verminderde leverenzymactiviteit. Daarnaast ontstaat ook hypo-albuminemie en een verhoogd distributievolume ten gevolge van oedeem. Dikwijls is er bij patiënten met cirrose ook een zekere graad van nierinsufficiëntie (zie *Inl.6.1.2.*).
- Patiënten met levercirrose zijn vaak gevoeliger voor ongewenste effecten, zoals nierfunctiestoornissen door NSAID's of sedatieve effecten door opioïden en psychofarmaca.



- Sommige geneesmiddelen zijn prodrugs en worden in de lever omgezet tot een actieve molecule; zij kunnen minder werkzaam zijn bij ernstig leverlijden.
- In de rubriek “Contra-indicaties” van dit Repertorium wordt leverlijden slechts vermeld als dit expliciet vermeld wordt in de rubriek “Contra-indicaties” van de SKP of in het hoofdstuk “Levercirrose” van *Commentaren Medicatiebewaking*. In zeldzame gevallen is een middel volgens de SKP gecontra-indiceerd maar wordt het in de Nederlandse evaluatie beoordeeld als “veilig bij levercirrose”. In dat geval wordt dit **expliciet** vermeld in onze rubriek “Contra-indicaties”. Zie *Inl.2.4*.

#### INL. 6.1.4. Genetische aanleg

- Genetische verschillen komen voor ter hoogte van enzymen die een rol spelen in de afbraak van geneesmiddelen, maar ook ter hoogte van transporteiwitten en van receptoren betrokken bij de interactie van een geneesmiddel met het doelwitorgaan.
- In verband met genetische verschillen ter hoogte van enzymen die de afbraak en dus het antwoord op een geneesmiddel kunnen beïnvloeden, is vooral het genetische polymorfisme ter hoogte van bepaalde cytochroom P450-iso-enzymen (o.a. CYP2D6, CYP2C9 en CYP2C19, zie *Inl.6.3.*) goed bekend [zie *Folia augustus 2003 en december 2006*].
- Genetische verschillen ter hoogte van transporteiwitten (bv. P-gp) zijn beschreven maar de klinische relevantie blijft onduidelijk, tenzij voor de OATP1B1-transporter die tussenkomt in de opname van statines in de lever. Vooral voor simvastatine is een verhoogde plasmaconcentratie en een verhoogd risico van myopathie gevonden bij personen met verlaagde OATP1B1-functie.
- Genetische factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van ongewenste effecten ten gevolge van bepaalde geneesmiddelen [zie *Folia februari 2009*].

#### INL. 6.1.5. Plasmaconcentratie monitoring (TDM)

- Het opvolgen of bepalen van de geneesmiddelenconcentratie in het plasma of in sommige gevallen in het bloed (Therapeutische Drug Monitoring of TDM) kan nuttig zijn wanneer aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:
  - het gaat om een geneesmiddel met nauwe therapeutisch-toxische marge;
  - er is een sterke interindividuele variabiliteit in de farmacokinetiek, of de farmacokinetiek wordt sterk beïnvloed door ziekte toestanden of interacties;
  - er is een goede correlatie tussen enerzijds de concentratie en anderzijds het therapeutisch effect of de ongewenste effecten,
  - het effect is niet gemakkelijk meetbaar.
- TDM laat toe de dosering aan te passen op maat van de patiënt, en kan een instrument zijn om ondermeer therapietrouw of geneesmiddeleninteracties te beoordelen.
- Voor sommige geneesmiddelen, bv. de immunosuppressiva ciclosporine, everolimus, mycofenolaat, sirolimus en tacrolimus, variëren de gewenste concentraties in functie van de leeftijd, de indicatie en het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen.
- In het Repertorium worden de therapeutische plasmaconcentratiespiegels vermeld voor digoxine, lithium, theofylline en een aantal anti-epileptica (carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en valproïnezuur). Ook voor andere geneesmiddelen kan bepaling van de concentratie in plasma (of in sommige gevallen bloed) nuttig zijn, bv. adalimumab, aminoglycosiden, glycopeptiden, infliximab, lamotrigine, methotrexaat, oxcarbazepine, voriconazol.
- Bij de interpretatie van de concentratie in het plasma of het bloed is overleg met de klinisch bioloog vaak wenselijk.

#### INL. 6.2. Ongewenste effecten

- Ongewenste effecten van geneesmiddelen zijn dikwijls weinig ernstig, maar zeer ernstige, soms levensbedreigende reacties zijn mogelijk. Sommige ongewenste effecten zijn voorspelbaar op basis van



de farmacologische eigenschappen van het geneesmiddel of van de geneesmiddelenklasse; deze zijn meestal dosisafhankelijk. Andere ongewenste effecten zijn niet voorspelbaar ("idiosyncratisch"), met vaak een immunologische of genetische oorzaak; soms is het mechanisme van optreden niet bekend.

- In dit Repertorium worden enkel de belangrijkste ongewenste effecten vermeld (frequente of ernstige) met als belangrijkste bron o.a. Martindale (zie *Inl.2.5.*); voor meer details moeten de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) of gespecialiseerde werken geraadpleegd worden.
- Voor sommige geneesmiddelen is het verschil tussen werkzame en toxische dosis gering: het zijn **geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge**. Zelfs een beperkte toename van de plasmaconcentraties, bijvoorbeeld door interactie, kan leiden tot potentieel levensbedreigende ongewenste effecten. Het gaat om volgende geneesmiddelen.
  - Geneesmiddelen die vermeld worden in de lijst van "geneesmiddelen met nauwe therapeutische toxische marge", zoals opgesteld door het Belgische geneesmiddelenagentschap (FAGG): de aminoglycosiden, bepaalde anti-aritmica (amiodaron, disopyramide, flecaïne, lidocaïne, propafenon, sotalol), bepaalde anti-epileptica (carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine, primidon, valproïnezuur), clozapine, colchicine, digoxine en methyldigoxine, bepaalde immunosuppressiva (azathioprine, ciclosporine, everolimus, mycofenolaat, sirolimus en tacrolimus), levothyroxine, lithium, theofylline en de vitamine K-antagonisten (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) [zie [https://www.fagg.be/sites/default/files/content/nota\\_vos\\_versie\\_8.pdf](https://www.fagg.be/sites/default/files/content/nota_vos_versie_8.pdf) (versie 31/01/2020)]. Voor deze geneesmiddelen wordt afgeraden om, zonder voorzorgsmaatregelen, over te schakelen van de ene specialiteit naar de andere specialiteit (vermelding "no switch" in de prijsvergelijkingstabellen (weergave "per groepsnaam")).
  - Geneesmiddelen die ernstige ongewenste effecten kunnen veroorzaken: de andere anti-epileptica dan deze vermeld in de lijst van het FAGG (zie hoger), immunosuppressiva en antiaritmica, de antitumorale middelen, de opioïden, de directe orale anticoagulantia (DOAC's), de insulines, de gliniden en de hypoglykemiërende sulfamiden, en de geneesmiddelen die QT-verlenging en *torsades de pointes* kunnen veroorzaken.

### INL. 6.2.1. Geneesmiddelenbewaking

Geneesmiddelenbewaking, d.w.z. het opsporen van ongewenste effecten van geneesmiddelen nadat deze op de markt zijn gebracht, is noodzakelijk gezien het risicoprofiel van een geneesmiddel op het ogenblik van commercialisering meestal nog onvoldoende bekend is.

- **Spontaan melden van ongewenste effecten:** zie *Folia september 2020* en de Auditorium e-learning "Melden van ongewenste effecten".
  - Spontane meldingen aan een centrum voor geneesmiddelenbewaking zijn essentieel om in een vroeg stadium signalen van ongewenste effecten te detecteren. Signalen kunnen leiden tot maatregelen die veiliger gebruik van een geneesmiddel moeten garanderen. In België wordt een systeem voor spontane meldingen beheerd door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking (de afdeling "Vigilantie") van het FAGG.
- **Wat melden?**
  - Ernstige effecten: levensbedreigende of fatale effecten; effecten met (verlengde) ziekenhuisopname of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot gevolg; aangeboren afwijkingen.
  - Onverwachte effecten: als de aard, de ernst en/of de evolutie niet overeenstemmen met wat vermeld wordt in de SKP van het geneesmiddel.
  - Bekende effecten, maar waarvan de frequentie, ernst en/of uitkomst onverwacht zijn.
  - Effecten die optreden in specifieke situaties: na toediening aan kwetsbare groepen, bv. kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, ouderen; na toediening van vaccins; bij overschakelen van een "origineel" naar een generisch geneesmiddel of omgekeerd; na toediening van een geneesmiddel dat onderworpen is aan aanvullende monitoring (aangeduid met het



symbool ▼, zie onder), en in geval van oneigenlijk gebruik of off-label gebruik.

- “Medicatiefouten”: dit zijn onopzettelijke vergissingen die de patiënt schade berokkenen of kunnen berokkenen. Het gaat meestal om vergissingen bij het voorschrijven, afleveren, stockeren, bereiden en toedienen van een geneesmiddel.
- **Hoe melden?**
  - via <https://www.fagg.be/nl/bijwerking> voor het melden van vermoede ongewenste effecten en voor het melden van medicatiefouten met ongewenst effect tot gevolg;
  - via [medication-errors@fagg.be](mailto:medication-errors@fagg.be) voor het melden van medicatiefouten zonder ongewenste effecten tot gevolg.
- **Wie kan melden?** Artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen, alsook patiënten zelf (en hun naasten) kunnen ongewenste effecten melden.
- **Direct Healthcare Professional Communication (DHPC)** zijn rechtstreekse communicaties van de farmaceutische bedrijven aan de gezondheidszorgbeoefenaars over risico's en maatregelen om deze risico's te beperken, in het algemeen op vraag van het EMA of het FAGG. De DHPC's zijn te raadplegen via de *website van het FAGG*, en worden aangekondigd in de BCFI-nieuwsbrief “Weekly Folia”.
- Het symbool “zwarte driehoek” (▼) vestigt de aandacht op de specialiteiten die onderworpen zijn aan “aanvullende monitoring”. Het gaat om specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel, biologische geneesmiddelen, geneesmiddelen vergund onder bepaalde voorwaarden of in uitzonderlijke omstandigheden, en geneesmiddelen waarvoor veiligheidsstudies zijn geëist bij de fabrikant. Het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking volgt deze middelen van nabij. Bij vermoede ongewenste effecten van deze middelen is rapporteren erg belangrijk, zelfs bij twijfel over een causaal verband. In principe behoudt een specialiteit gedurende 5 jaar de zwarte driehoek, maar de periode kan verlengd worden. Het symbool staat in de SKP en de bijsluiters voor het publiek van de betrokken specialiteiten, en wordt ook vermeld in het Repertorium ter hoogte van de betrokken specialiteiten. Een maandelijks bijgewerkte lijst van geneesmiddelen waarvoor het symbool wordt getoond, is te vinden op de *website van het FAGG* en op “Meld ongewenste effecten” op onze website.
- Het symbool ▼ vestigt de aandacht op de specialiteiten waarvoor **Risk Minimization Activities (RMA)** van toepassing zijn. Het gaat om risicobeperkende activiteiten zoals educatief materiaal en brochures, opgelegd door de vergunningsautoriteit [voor details, zie *Folia maart 2015*]. Bij klikken op dit symbool komt men op de website van het FAGG, waar de documenten voor de respectievelijke specialiteiten kunnen gedownload worden.
- In de Folia Pharmacotherapeutica verschijnt in principe 1 keer per maand een rubriek “Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking”.

### INL. 6.2.2. QT-verlenging en torsades de pointes

Zie Folia september 2024 en Folia november 2012.

Torsades de pointes zijn ventrikeltachycardiën die fataal kunnen aflopen. Ze zijn meestal geassocieerd aan een verlengd QT-interval op het elektrocardiogram (ECG). Er is daarom veel aandacht voor de QT-verlenging door geneesmiddelen.

- **Risicosituaties en risicofactoren voor torsades de pointes**
  - Of de QT-verlenging op ECG aanleiding zal geven tot aritmie is een complex proces, en aritmie treedt meestal slechts op bij een combinatie van risicofactoren of in geval van risicosituaties:
    - combineren van twee QT-verlengende geneesmiddelen,
    - associëren van een QT-verlengend geneesmiddel aan een geneesmiddel dat diens afbraak inhibeert,
    - associëren van een QT-verlengend geneesmiddel aan een bradycardiserend geneesmiddel (bv. ivabradine, cholinesterase-inhibitoren gebruikt bij ziekte van Alzheimer). De  $\beta$ -blokkers (uitgezonderd sotalol), diltiazem en verapamil stellen in dit verband waarschijnlijk geen probleem niettegenstaande hun bradycardiserend effect.



- Associëren van een QT-verlengend geneesmiddel aan een geneesmiddel dat elektrolytenstoornissen kan veroorzaken (bv. kaliumverliezende diuretica).
- Risicofactoren zijn:
  - leeftijd > 65 jaar,
  - vrouwelijk geslacht,
  - hartlijden (hartfalen, ischemie, bradycardie, tweede- en derdegraads atrioventriculair blok),
  - elektrolytenstoornissen (hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie),
  - congenitaal lang QT-syndroom.
- *Geneesmiddelen met risico van QT-verlenging.* In Tabel Ib. zijn de geneesmiddelen opgenomen die een risico van QT-verlenging, en dus torsades de pointes geven. De lijst is hoofdzakelijk gebaseerd op de lijst "Known risk of Tdp" op de website van CredibleMeds® ([www.crediblemeds.org](http://www.crediblemeds.org)) en op de lijst "High risk" in *Stockley's Drug Interactions*; voor geneesmiddelen met symbool ▼, alsook voor de geneesmiddelen die specifiek zijn voor de Belgische markt wordt de SKP gevolgd. Voor de geneesmiddelen waarvoor in de tabel een "mogelijk" risico wordt vermeld, werd QT-verlenging gerapporteerd, maar is de klinische relevantie minder duidelijk. Voor vele geneesmiddelen ontbreken de gegevens om het risico van QT-verlenging te kunnen inschatten. Het feit dat een geneesmiddel niet in deze tabel is opgenomen, betekent zeker niet dat een risico van QT-verlenging uitgesloten is.
- De onafhankelijke onderzoeksgroep achter CredibleMeds® heeft een online decision support tool voor de inschatting van het risico van QT-verlenging bij individuele patiënten ontwikkeld: MedSafety Scan® ([www.medsafetyscan.org](http://www.medsafetyscan.org)). Op basis van patiëntenkarakteristieken en de medicatielijst van de patiënt wordt een inschatting gemaakt van het risico van QT-verlenging bij deze patiënt. Naast de inschatting van het risico van een verlengd QT-interval identificeert de tool ook de geneesmiddelen en geneesmiddeleninteracties die bijdragen aan dit risico. Ten slotte stelt de tool ook acties voor die men kan ondernemen om het risico van verlengd QT-interval te verkleinen.

**Tabel Ib. Geneesmiddelen met risico van QT-verlenging en torsades de pointes (niet-exhaustieve lijst)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.: ivabradine<br>1.2.4.: ranolazine<br>1.8.: meerdere antiaritmica, vooral disopyramide, flecaïnide, sotalol en vernakalant; amiodaron veroorzaakt zelden torsades de pointes                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4.1.: domperidon (vooral bij doses > 30 mg per dag)<br>3.4.2.: ondansetron (vooral bij hoge i.v. doses); mogelijk ook de andere 5HT <sub>3</sub> -antagonisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.5.2.: terlipressine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.3.: methadon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.2.2.: hydroxychloroquine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.2.: meerdere antipsychotica, vooral droperidol, levomepromazine, pimozide, sertindol, sulpiride, hoge doses haloperidol<br>10.3.: citalopram, escitalopram<br>10.4.: guanfacine, pitolisant<br>10.11.1.: donepezil; mogelijk ook galantamine                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.1.2.: erythromycine (vooral i.v.), azithromycine, clarithromycine, roxithromycine<br>11.1.5.: ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin; mogelijk ook norfloxacin en ofloxacin<br>11.1.8.5.: bedaquiline<br>11.2.3.: fluconazol; mogelijk ook itraconazol, posaconazol, voriconazol<br>11.3.2.: arthemeter + lumefantrine, kinine<br>11.3.4.: pentamidine<br>11.4.3.: mogelijk voor atazanavir, fostemsavir, lopinavir, rilpivirine en associaties van deze middelen |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4.1.: hydroxyzine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.1.1.2.: oxaliplatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13.2.1.: inotuzumab ozogamicine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.2.3.: bosutinib, ceritinib, crizotinib, entrectinib, ivosidenib, lenvatinib, nilotinib, osimertinib, pralsetinib, quizartinib, ribociclib, selipercatinib, tepotinib, vandetanib, vemurafenib; mogelijk ook asciminib, cabozantinib, dabrafenib, dasatinib, encorafenib, gilteritinib, lapatinib, lorlatinib, midostaurine, pazopanib, sorafenib, sunitinib |
| 13.4.: anagrelide, arseentrioxide, panobinostat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.1.1.: propofol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.3.: berotralstat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### INL. 6.2.3. Anticholinerge ongewenste effecten

- **Centrale anticholinerge ongewenste effecten** zijn vooral duizeligheid, zelden cognitieve achteruitgang en delirium, met of zonder agitatie.
- **Perifere anticholinerge ongewenste effecten** zijn vooral monddroogte (met verhoogd risico van tandcariës) en droge ogen, verminderde zweetsecretie, nausea en obstipatie, mydriase en accommodatiestoornissen, urineretentie; zelden tachycardie en ritmestoornissen.
- Een aantal geneesmiddelen wordt in dit Repertorium als “anticholinergica” (syn. muscarinereceptorantagonisten of atropine-achtigen) aangeduid, gezien het beoogde effect berust op hun anticholinerge eigenschappen. Het gaat om butylhyoscinebromide bij abdominale krampen, anticholinergica bij blaasfunctiestoornissen, anticholinergica bij astma en COPD, anticholinergica bij de ziekte van Parkinson, bepaalde mydriatica en cycloplegica, atropine.
- Heel wat andere geneesmiddelen hebben anticholinerge eigenschappen, maar worden niet omwille van deze eigenschappen gebruikt; ze geven echter wel anticholinerge ongewenste effecten. Het gaat vooral om bepaalde antidepressiva (vooral tricyclische antidepressiva (vooral amitriptyline) en paroxetine), bepaalde H<sub>1</sub>-antihistaminica (vooral difenhydramine, dimenhydrinaat, hydroxyzine en meclozine; in mindere mate cetirizine, doxylamine, fexofenadine en loratadine), bepaalde antipsychotica (vooral fenothiazines, clozapine, haloperidol, olanzapine, pimozide, quetiapine), baclofen, carbamazepine en oxcarbazepine, disopyramide, nefopam en tizanidine.
- **Geneesmiddelen met anticholinerge eigenschappen zijn gecontra-indiceerd in geval van:** (risicofactoren van) gesloten-hoekglaucoom; refluxoesofagitis; prostaathypertrofie; intestinale atonie; paralytische ileus; ernstige *colitis ulcerosa*; *myasthenia gravis*.
- **Voorzichtigheid is vooral geboden bij kinderen en ouderen:** ze zijn gevoeliger voor de anticholinerge ongewenste effecten; verlagen van de dosis kan aangewezen zijn en combineren van verschillende middelen met anticholinerge werking is te mijden. Andere risicosituaties zijn hyperthermie, pylorusstenose, tachycardie (bv. door hyperthyreoïdie, hartfalen), hypertensie en acuut myocardinfarct. Overdreven sedatie kan optreden bij associëren met andere geneesmiddelen met sederend effect of met alcohol.

### INL. 6.2.4. Serotoninesyndroom

- Het serotoninesyndroom wordt gekenmerkt door volgende triade:
  - neuromusculaire agitatie (clonus, hyperreflexie, myoclonus, rigiditeit, tremor),
  - disfunctie van het autonome systeem (o.a. hyperthermie die soms fataal is, tachycardie), en
  - veranderde mentale status (o.a. agitatie, verwardheid).
- Ernstig serotoninesyndroom is een urgentie, met nood voor intensieve ondersteunende zorg in het ziekenhuis.
- Ernstige gevallen van serotoninesyndroom worden meestal gezien bij inname van twee of meer serotonerge geneesmiddelen, waarvan meestal één **MAO-A-inhibitor of een niet-selectieve MAO-inhibitor**.



In België zijn alleen de reversibele MAO-A-inhibitor moclobemide en de niet-psychotrope MAO-inhibitoren linezolid (een antibioticum) en methyleenblauw beschikbaar. **Zeker de associatie van deze MAO-inhibitoren met een SSRI moet vermeden worden.**

- **Andere serotonerge geneesmiddelen** kunnen eveneens, in onderlinge associatie, aanleiding kunnen geven tot het serotoninesyndroom. In zeldzame gevallen wordt het serotoninesyndroom veroorzaakt door overdosering van één serotonerg middel. Belangrijkste serotonerge geneesmiddelen: SSRI's (met inbegrip van dapoxetine) en andere antidepressiva (duloxetine, venlafaxine, clomipramine, imipramine, vortioxetine), bepaalde opioïden (fentanyl, hydromorfon, methadon, oxycodon, pentazocine, pethidine, tapentadol, tramadol), dextromethorfan, lithium, sint-janskruid, amfetaminen en derivaten (bv. ecstasy). Ook voor volgende geneesmiddelen is een risico van serotoninesyndroom gesuggereerd of niet uit te sluiten: mirtazapine, trazodon, de triptanen, en de MAO-B-inhibitoren selegiline, rasagiline en safinamide.
- **De belangrijkste serotoninerge geneesmiddelen\* zijn:**
  - amfetaminen en derivaten (bv. ecstasy)
  - volgende antidepressiva:
    - de SSRI's, met inbegrip van dapoxetine
    - andere: duloxetine, venlafaxine, clomipramine, imipramine, vortioxetine
  - chloorfenamine
  - cocaïne
  - dextromethorfan
  - MAO-inhibitoren: moclobemide, linezolid, methyleenblauw
  - bepaalde opioïden: fentanyl, methadon, pethidine, tramadol
  - sint-janskruid (*hypericum perforatum*)
  - trazodon.
- **Andere geneesmiddelen waarvoor een risico van serotoninesyndroom is gesuggereerd, maar het mechanisme is onduidelijk of de evidentie is beperkt\* :**
  - bupropion
  - lithium
  - methylfenidaat
  - mirtazapine
  - bepaalde opioïden: buprenorfine, codeïne, morfine, oxycodon, tapentadol
  - tricyclische antidepressiva behalve clomipramine en imipramine
  - triptanen
  - MAO-B-inhibitoren: selegiline, rasagiline en safinamide.

\* bron: Stockley Drug Interactions (tabel 36.3.).

### INL. 6.2.5. Maligne antipsychoticasyndroom

- *Zie Folia de février 2008 en Folia d'avril 2021.*
- Het maligne antipsychoticasyndroom (vroeger maligne neurolepticasyndroom genoemd) is een zeldzaam maar zeer ernstig ongewenst effect van antipsychotica. Het syndroom is ook beschreven bij combineren van antipsychotica met lithium, en bij plots stoppen van levodopa, dopamine-agonisten en COMT-inhibitoren.
- Het risico is groter in het begin van de behandeling, na een dosisverhoging of bij gebruik van hoge, parenteraal toegediende doses. Risicofactoren zijn o.a. dehydratie en antecedenten van maligne antipsychoticasyndroom.
- Het syndroom wordt gekenmerkt door het vrij plots optreden van extrapiramidale rigiditeit, onwillekeurige bewegingen en hyperthermie, vaak gecombineerd met dysartrie, dysfagie en acute nierfunctiestoornis. Er kunnen ook bewustzijnsverandering en ontregeling van het autonome zenuwstelsel optreden. Het syndroom kan fataal aflopen door nierinsufficiëntie en hyperthermie met tachycardie.
- Dringende hospitalisatie, met nood voor intensieve ondersteunende zorg, is noodzakelijk.



### INL. 6.2.6. Ernstige huidreacties door geneesmiddelen

Voor meer details, onder andere de meest betrokken geneesmiddelen: zie *Folia mei 2021*.

- Stevens-Johnson syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN, syn.: Lyell-syndroom), DRESS- (*Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*)-syndroom en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustuleuze dermatitis (AGEP) zijn de belangrijkste types van **ernstige huidreacties door geneesmiddelen**. Ze kunnen gepaard gaan met uitgesproken morbiditeit en zelfs mortaliteit.
- **Essentiële maatregelen om acute morbiditeit en mortaliteit te beperken of voorkomen, en langetermijngevolgen tegen te gaan zijn:** snel herkennen van het probleem, identificeren en stoppen van het verdachte geneesmiddel, en nooit meer opnieuw toedienen van het betreffende geneesmiddel. **Bij optreden ervan is een dringende, gespecialiseerde aanpak in het ziekenhuis vereist.**
- **SJS en TEN** zijn varianten van epidermale necrolyse (huidloslating < 10 % voor SJS; huidloslating > 30 % voor TEN). De huidreacties worden frequent voorafgegaan door achteruitgang van de algemene toestand, koorts, influenza-achtige symptomen, symptomen ter hoogte van de ogen, neus, keel en oren, en pijn ter hoogte van de huid.
- **DRESS-syndroom** omvat heterogene klinische symptomen, bestaande uit orgaanaantasting (vooral de lever), al dan niet met huidreacties en biologische afwijkingen. De prodromale fase (met koorts, lymfadenopathie, influenza-achtige symptomen, brandende pijn, jeuk) kan tot 2 weken voor de huidreacties optreden.
- **AGEP** wordt gekarakteriseerd door talrijke kleine, vooral niet-folliculaire steriele pustels. De huidreacties treden op gelijktijdig met hoge koorts en leukocytose.

### INL. 6.2.7. Hyperkaliëmie

Zie *Folia april 2010*.

- Hyperkaliëmie (kaliumserumconcentratie of  $K^+ > 5,5$  mmol/l) kan leiden tot ernstige cardiale problemen (gaande tot ventrikularitmieën) en neuromusculaire problemen (spierzwakte, gaande tot paralyse).
- Ernstige hyperkaliëmie ( $K^+ > 6,5$  mmol/l, of  $K^+ > 6,0$  mmol/l gepaard gaande met ECG-veranderingen) is een levensbedreigende situatie en vereist een dringende aanpak in hospitaalmilieu onder cardiale monitoring.
- Bij normale nierfunctie wordt overtollig kalium gemakkelijk uitgescheiden. Hyperkaliëmie wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren, met als belangrijkste nierinsufficiëntie (let op bij ouderen en diabetici) en inname van bepaalde geneesmiddelen.
- Geneesmiddelengroepen die hyperkaliëmie kunnen veroorzaken, zijn o.a. ACE-inhibitoren, sartanen, kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen, heparines, NSAID's. Daarnaast komt hyperkaliëmie ook voor met ciclosporine, drospirenon, erythropoëties, tacrolimus, trimethoprim. Deze geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden bij patiënten met voorafbestaande hyperkaliëmie. Sommige geneesmiddelen bevatten kaliumzouten (bv. kaliumsulfaat in Eziclen®, kaliumwaterstofcarbonaat in Gaviscon Advance Munt®, kaliumcitraat in Uralyt U®).
- Kaliumsupplementen en kaliumsparende diuretica moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met nierinsufficiëntie. Alle specialiteiten in deze groepen hebben symbool  of  (zie Inl.2.4.).
- Gelijktijdig gebruik van meerdere van bovenvermelde middelen (bv. lage doses spironolacton samen met een ACE-inhibitor bij hartfalen) dient voorzichtig te gebeuren. Gelijktijdig gebruik van kaliumsupplementen en kaliumsparende diuretica is te vermijden.

### INL. 6.2.8. Convulsies en epileptische aanvallen uitgelokt door geneesmiddelen

- Geneesmiddelen die convulsies en epileptische aanvallen kunnen uitlokken zijn o.a. antidepressiva (TCA's en aanverwanten, SSRI's), antipsychotica (frequent met clozapine), bupropion, middelen tegen ADHD en narcolepsie, chinolonen, theofylline, tapentadol, tramadol. Het risico is groter wanneer deze



geneesmiddelen onderling worden gecombineerd. Bij patiënten met alcoholmisbruik kunnen deze geneesmiddelen het risico van convulsies bij plots stoppen van alcohol verder verhogen.

- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met antecedenten van convulsies.
- Ook bij hypoglykemie door antidiabetica kunnen convulsies optreden.
- Geneesmiddelen die convulsies kunnen uitlokken bij plotse onderbreking van chronisch gebruik zijn o.a. benzodiazepines, Z-producten, barbituraten.

#### **INL. 6.2.9. Porfyrie-aanvallen uitgelokt door geneesmiddelen**

- Sommige geneesmiddelen kunnen een aanval van acute porfyrie uitlokken (met hevige buikklachten, pijn, convulsies ...). Porfyrie is een groep aandoeningen berustend op een afwijking in de biosynthese van haem, een belangrijk bestanddeel van hemoglobine en van andere eiwitten zoals cytochroom P450-enzymen.
- Veel geneesmiddelen zijn onveilig bij patiënten met porfyrie. Het gaat bijvoorbeeld om sterke inductoren van het cytochroom P450-systeem die de synthese van het defecte haem ter hoogte van de lever stimuleren (b.v. barbituraten, fenytoïne). Van andere geneesmiddelen is niet gekend via welk mechanisme ze een acute aanval van porfyrie kunnen veroorzaken.
- Gezien de zeldzaamheid van deze aandoening en de tegenstrijdige informatie uit de literatuur wordt porfyrie in het Repertorium voor geen enkel geneesmiddel vermeld als contra-indicatie. Voor informatie over porfyrie verwijzen we naar de website van het *International Porphyria Network* (<https://porphyrianet.org/en>). Op deze website wordt doorverwezen naar de Noorse databank [www.drugs-porphyria.org](http://www.drugs-porphyria.org) voor informatie over geneesmiddelen en acute hepatische porfyrie.

#### **INL. 6.2.10. Extrapiramidale symptomen**

Zie ook *Folia april 2021*.

- Extrapiramidale symptomen zijn vooral:
  - dystonie: aanhoudende of wisselend verhoogde spierspanning die resulteert in herhaalde draaiende of wringende bewegingen, bv. in oogleden of de nek;
  - acathisie: een onvrijwillige, continue motorische onrust;
  - parkinsonisme: het hypokinetisch-rigide syndroom.
- Extrapiramidale symptomen zijn vooral beschreven met antipsychotica (minder bij atypische antipsychotica) en met metoclopramide.
- De toediening van een anticholinergicum verbetert de dystonie symptomen.
- Kinderen en ouderen hebben een groter risico van extrapiramidale symptomen.

#### **INL. 6.2.11. Hemolyse door glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD)-deficiëntie**

- Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD)-deficiëntie (favisme) is een erfelijke aandoening veroorzaakt door een afwijking (mutatie) in het G6PD-gen. De deficiëntie verhoogt de gevoeligheid van rode bloedcellen voor oxidatieve schade door geneesmiddelen, met risico van hemolyse en van anemie. Er bestaan veel varianten van G6PD-deficiëntie, met wisselende klinische gevolgen. De incidentie van G6PD-deficiëntie is laag onder de oorspronkelijke bevolking van de Noord-Europese landen (0,1%), maar is hoger in onder andere sub-Saharisch Afrika (8%; variërend van 3 tot 23%).
- Een aantal geneesmiddelen zijn omwille van hemolyse te vermijden bij alle vormen van G6PD-deficiëntie: methyleenblauw, rasburicase, zilversulfadiazine (crème). Dit wordt vermeld in de rubriek "Contra-indicaties" van het geneesmiddel in het Repertorium. Andere geneesmiddelen zijn enkel te vermijden bij G6PD-deficiëntie met chronische hemolytische anemie, maar zijn in therapeutische dosering wel toepasbaar bij de minder ernstige varianten: acetylsalicylzuur, ascorbinezuur (vitamine C), de chinolonen, co-trimoxazol, fytomenadion (vitamine K), glibenclamide, hydroxychloroquine, isoniazide, nitrofurantoïne, paracetamol, sulfasalazine, thiamfenicol. Dit wordt vermeld in de rubriek "Ongewenste effecten" en "Bijzondere voorzorgen" van het geneesmiddel in het Repertorium. Chlooramfenicol



oogdruppels zijn bij patiënten met G6PD-deficiëntie te vermijden in verband met mogelijke toename van risico van cataract. [Bron: "Commentaren Medicatiebewaking"].

### INL. 6.3. Interacties van geneesmiddelen

- Hier vindt u de algemene principes over interacties van geneesmiddelen. Hoe deze algemene principes in het Repertorium worden toegepast, vindt u in *Inl.2.8*.
- Zie ook de e-learnings
  - "Interacties – (niet) zo eenvoudig?"
  - "Interacties – de 'usual suspects'"
  - *Interacties aanpakken in de praktijk*.
- Naast geneesmiddel-geneesmiddel-interacties, zijn er ook interacties van geneesmiddelen met voeding, alcohol en sigarettenrook. Voor de interacties van geneesmiddelen met alcohol verwijzen we naar *Folia maart 2017*.
- Toedienen van meerdere geneesmiddelen is vaak nuttig, en soms noodzakelijk om een additief effect te komen (bv. bij hypertensie). Soms is een interactie gewenst en worden geneesmiddelen in een vaste combinatie geassocieerd, waarbij het ene geneesmiddel de afbraak van het andere geneesmiddel inhibeert: voorbeelden zijn levodopa + dopa-decarboxylaseremmer; nirmatrelvir + ritonavir (een CYP3A4-inhibitor); elvitegravir of darunavir + cobicistat (een CYP3A4-inhibitor).
- Toedienen van twee of meer geneesmiddelen, en zeker polyfarmacie kan echter aanleiding geven tot ongewenste interacties en moeilijkheden met therapietrouw. Hieronder wordt vooral aandacht besteed aan ongewenste interacties, waarbij zowel de ernst als de frequentie van optreden belangrijk zijn bij het inschatten van de klinische relevantie. **Het is dikwijls niet gemakkelijk te voorspellen of een bepaalde interactie klinisch belangrijke gevolgen zal hebben.** Er is immers een uitgesproken interindividuele variabiliteit. Daarenboven wordt het optreden van interacties en de ernst ervan sterk beïnvloed door factoren zoals het onderliggend lijden, de leeftijd, de genetische aanleg, de comediatie en de dosis en duur van het gebruik.
- De risico's en de baten van het combineren van interagerende geneesmiddelen moeten steeds tegen elkaar afgewogen worden. Gelijktijdige toediening is zelden een contra-indicatie. Nauwgezette opvolging van de patiënt laat dikwijls toe om bepaalde geneesmiddelen toch samen toe te dienen, soms wel met doseringsaanpassing. Zeker als het gaat om geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge (zie *Inl.6.2*), is voorzichtigheid geboden. Een alternatief geneesmiddel gebruiken of een minder noodzakelijk geneesmiddel (tijdelijk) stoppen is vaak de beste optie wanneer klinisch belangrijke gevolgen mogelijk zijn.
- Voor bepaalde sterk gespecialiseerde geneesmiddelengroepen met zeer grote kans op interacties bestaan handige en vrij toegankelijke websites:
  - voor HIV medicatie [www.hiv-druginteractions.org](http://www.hiv-druginteractions.org),
  - voor hepatitis B- en C- medicatie [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org),
  - voor antitumorale middelen <https://www.cancer-druginteractions.org/> (wordt sinds juni 2022 niet meer geüpdated),
  - voor geneesmiddelen bij COVID-19 <https://www.covid19-druginteractions.org/>

Interacties kunnen zich afspelen op farmacodynamisch vlak en op farmacokinetisch vlak. Het belang van farmacodynamische interacties wordt vaak onderschat. Dit komt waarschijnlijk omdat ze, in tegenstelling tot farmacokinetische interacties, niet kunnen gedetecteerd worden door het meten van de plasmaconcentraties.

#### *Farmacodynamische interacties*

- Men spreekt van farmacodynamische interacties wanneer toediening van meerdere geneesmiddelen of toediening van geneesmiddelen samen met bv. voeding of alcohol, leidt tot een **verandering van het antwoord, zonder dat de concentraties van de betrokken geneesmiddelen in het organisme wijzigen**.
- Geneesmiddelen kunnen elkaars effect versterken of tegenwerken. Het kan bv. gaan om competitie t.h.v. een receptor (een agonist en een antagonist), om ingrijpen van meerdere geneesmiddelen op eenzelfde



eindorgaan (bv. de hersenen, met overdreven sedatie), of om geneesmiddelen die ingrijpen op verschillende niveaus van eenzelfde stelsel (bv. verstoren van de cardiovasculaire homeostase of van het normale stollingsproces).

- Farmacodynamische interacties zijn vaak een klasse-effect, terwijl farmacokinetische interacties vaker specifiek zijn voor één bepaald geneesmiddel.
- Zoals de farmacokinetische interacties zijn de farmacodynamische vooral belangrijk voor geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge (zie *Inf.6.2*).

#### *Farmacokinetische interacties*

- Farmacokinetische interacties kunnen zich afspelen t.h.v. de resorptie, de distributie, de afbraak en de excretie van een geneesmiddel. Het zijn interacties waarbij de **concentratie van een geneesmiddel in het organisme worden gewijzigd** door een ander geneesmiddel of bv. voeding of alcohol.
- **Een verandering van de concentratie van een geneesmiddel (het “slachtoffergeneesmiddel”) in het organisme leidt niet noodzakelijk tot een klinisch relevante verandering van het antwoord**, en kleine veranderingen van de concentraties zullen meestal geen gevolg hebben.
- **Verhoging van de concentratie** heeft vanzelfsprekend meer belang als het “slachtoffergeneesmiddel” potentieel levensbedreigende ongewenste effecten kan veroorzaken, zoals de geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge (zie *Inf.6.2*). Bij deze geneesmiddelen moet men ook waakzaam zijn voor farmacodynamische interacties.
- **Verlaging van de plasmaconcentratie** kan tot therapiefalen leiden, wat erg belangrijk kan zijn voor de geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge en bijvoorbeeld de anticonceptiva.
- Veel aandacht gaat naar interacties die leiden tot versnellen of vertragen van de **afbraak** van het substraat ( “slachtoffergeneesmiddel”) t.h.v. de lever.
  - Vertragen van de afbraak door enzyminhibitoren kan leiden tot een versterkt antwoord, en versnellen van de afbraak door enzyminductoren tot een verminderd antwoord.
  - Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Bij een aantal middelen is de omzetting tot een actieve metaboliet nodig voor het effect (bv. clopidogrel, codeïne, tamoxifen, prasugrel), het zijn “prodrugs”. Bij deze middelen is het effect van enzyminhibitie en -inductie omgekeerd: vertragen van de afbraak door enzyminhibitoren leidt tot verminderde omzetting naar het actief geneesmiddel en dus mogelijk tot verminderd antwoord. Voor geneesmiddelen met actieve metabolieten maar die zelf ook actief zijn (bv. tramadol) is de situatie complexer en is het gevolg van enzyminhibitie of -inductie moeilijk te voorspellen.
- **Interacties via CYP450-enzymen**
  - De afbraak van geneesmiddelen t.h.v. de lever gebeurt vooral onder invloed van het cytochroom P450(CYP)-systeem waarin verschillende CYP-iso-enzymen een rol spelen. Bij de mens zijn vooral de iso-enzymen CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 en CYP3A4 belangrijk bij de afbraak van frequent gebruikte geneesmiddelen. In *Tabel 1c* en *Tabel 1e* worden de belangrijkste substraten, inhibitoren en inductoren van deze CYP-iso-enzymen vermeld.
  - Sommige geneesmiddelen worden uitsluitend of vooral door één van deze iso-enzymen afgebroken; dikwijls is een geneesmiddel echter substraat van meerdere iso-enzymen.
  - Geneesmiddelen, alcohol, roken, pompelmoessap/pomelo en kruiden/plantenextracten kunnen de activiteit van deze iso-enzymen versterken (induceren) of verminderen (inhiberen). Er bestaan minder en meer potente inhibitoren en inductoren, en hun effect hangt ook af van hun concentratie, en dus van de dosis die gebruikt wordt. Ook is er een belangrijke interindividuele variabiliteit. De invloed van een inhibitor of een inductor kan vanzelfsprekend groter zijn indien het slachtoffergeneesmiddel (het substraat) uitsluitend of vooral wordt afgebroken door één iso-enzym, en indien er een nauwe therapeutisch-toxische marge is.
  - Interacties t.h.v. de CYP-iso-enzymen kunnen bestudeerd worden *in vitro*, door meten van de plasmaconcentraties, of door het bestuderen van het antwoord op het geneesmiddel. Het vinden van een verandering *in vitro* of van een gewijzigde plasmaconcentratie betekent niet automatisch dat er ook een klinisch relevante verandering in antwoord zal zijn.



- **Interacties via membraangebonden transporteiwitten**

- **P-glycoproteïne (P-gp)** is een ATP-gelinkte pomp aanwezig in bepaalde celmembranen, en verwijdert vreemde stoffen uit de cellen. Het vermindert de intestinale resorptie van substraten, verhoogt hun hepatische en renale eliminatie, en vermindert ter hoogte van de bloed-hersenbarrière de opname van substraten in de hersenen. Inductoren van P-gp verlagen de plasmaconcentraties van hun substraten; inhibitoren verhogen de plasmaconcentratie van hun substraten. In *Tabel 1d* en *Tabel 1e* worden de belangrijkste substraten, inhibitoren en inductoren van P-gp vermeld. Voor vele van deze substraten, inhibitoren en inductoren, is er een overlap met het CYP-iso-enzym 3A4.
- In tegenstelling tot P-gp faciliteren de transporters **OAT (organic anion transporters)** en **OATP (organic anion transporting polypeptides)** de opname van substraten in de cel. Ze bevinden zich ter hoogte van de celmembranen van diverse organen. Ter hoogte van de nieren zijn deze transporters (vooral OAT1 en OAT3) betrokken bij de renale excretie van sommige geneesmiddelen: ze verlagen de plasmaconcentratie van het geneesmiddel. Probenicid is een inhibitor van OAT1 en OAT3, en kan op die manier de renale excretie van een aantal geneesmiddelen verminderen (bv. penicillines, sommige cefalosporines, methotrexaat). Daarentegen spelen ter hoogte van de lever OATP1B1 en OATP1B3 een belangrijke rol in de opname van sommige geneesmiddelen. Ciclosporine is een inhibitor van OATP1B1 en OATP1B3, en kan op die manier de plasmaconcentraties van statines en van bosentan en ambrisentan verhogen. Sommige HIV-protease-inhibitoren (atazanavir + ritonavir; lopinavir + ritonavir) en roxadustat en roxadustat zijn OATP-inhibitoren, en kunnen op die manier de plasmaconcentraties van statines verhogen. Interacties waar OATP-remming een rol speelt zijn vaak complex en daardoor onvoorspelbaar.

**Tabel 1c. De CYP-iso-enzymen, met hun substraten, inhibitoren en inductoren**

De substraten, inhibitoren en inductoren waarvan men verwacht dat ze de klinisch meest relevante interacties zullen geven, zijn in vetjes aangeduid. Uiteraard wil dit niet zeggen dat interacties met niet-vetjes aangeduide geneesmiddelen geen risico inhouden. Voor meer informatie, zie *Inl.6.3*.

|               | <b>Substraten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Inhibitoren (↑<br/>substraatplasmaconcentratie)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Inductoren (↓<br/>substraatplasmaconcentratie)</b>                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CYP1A2</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Agomelatine, amitriptyline, <b>anagrelide</b>, asenapine, <b>bendamustine</b>, clomipramine, <b>clozapine</b>, coffeïne, <b>dacarbazine</b>, deferasirox, duloxetine, fezolinetant, <b>flecaïnide</b>, flutamide, frovatriptan, imipramine, leflunomide, lidocaïne, melatonine, olanzapine, <b>ondansetron</b>,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aciclovir, ciprofloxacin, coffeïne, deferasirox, ethinylestradiol, <b>fluvoxamine</b>, givosiran, methoxsaleen, oestrogenen en oestroprogestagenen, propafenon, ritlecitinib, stiripentol, ticlopidine, vemurafenib</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acalabrutinib, <b>carbamazepine</b>, <b>fenobarbital</b>, <b>fenytoïne</b>, <b>primidon</b>, <b>rifampicine</b>, sigarettenrook, teriflunomide</li></ul> |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>pirfenidon,<br/>pomalidomide,<br/>rasagiline, riluzol,<br/>ropinirol,<br/>ropivacaïne,<br/><b>theofylline</b>,<br/>tizanidine,<br/><b>warfarine</b>,<br/>zolmitriptan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CYP2B6</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bupropion,<br/><b>cyclofosfamide</b>,<br/>efavirenz,<br/><b>ifosfamide</b>,<br/><b>methadon</b>,<br/>nevirapine,<br/><b>propofol</b>, <b>thiotepa</b>,<br/><b>tramadol</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clopidogrel,<br/>ticlopidine,<br/>voriconazol</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carbamazepine,<br/>cenobamaat,<br/>efavirenz,<br/>ivosidenib,<br/>rifampicine,<br/>ritonavir</li> </ul>                                                                                              |
| <b>CYP2C8</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Amiodaron</b>,<br/><b>carbamazepine</b>,<br/>clonazepam,<br/><b>dabrafenib</b>,<br/>enzalutamide,<br/>etrasimod,<br/>fluvastatine,<br/>ibuprofen,<br/><b>imatinib</b>,<br/>loperamide,<br/>montelukast,<br/>ozanimod,<br/><b>paclitaxel</b>,<br/>pioglitazon,<br/>remdesivir,<br/><b>repaglinide</b>,<br/>riociguat,<br/>roxadustat,<br/>selexipag,<br/>treprostinil,<br/><b>tucatinib</b>, zopiclon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abirateron,<br/><b>clopidogrel</b>, co-<br/>trimoxazol,<br/>deferasirox,<br/>linzagolix,<br/>selpercatinib,<br/>teriflunomide,<br/>trimethoprim</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ivosidenib,<br/>rifampicine</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>CYP2C9</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abrocitinib,<br/><b>acenocoumarol</b>,<br/>avatrombopag,<br/>bosentan,<br/>candesartan,<br/>carvedilol,<br/>celecoxib, co-<br/>trimoxazol,<br/>diclofenac,<br/>etrasimod,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amiodaron,<br/>asciminib,<br/>capecitabine,<br/>ceritinib, co-<br/>trimoxazol,<br/><b>fluconazol</b>,<br/>fluorouracil,<br/>fluoxetine,<br/>fluvastatine,<br/>fluvoxamine,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apalutamide,<br/>aprepitant,<br/>bosentan,<br/><b>carbamazepine</b>,<br/>dabrafenib,<br/>enzalutamide,<br/><b>fenobarbital</b>,<br/><b>fentytoïne</b>,<br/>fosaprepitant,<br/>ivosidenib,</li> </ul> |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>fenobarbital,</b><br><b>fenprocoumon,</b><br><b>fenytoïne,</b><br>fluconazol,<br>flurbiprofen,<br>fluvastatine,<br><b>glibenclamide,</b><br><b>gliclazide,</b><br><b>glimepiride,</b><br><b>glipizide,</b><br><b>gliquidon,</b><br>ibuprofen,<br>indometacine,<br>irbesartan,<br>losartan,<br>meloxicam,<br>naproxen,<br>nitisinon,<br>piroxicam,<br>rosuvastatine,<br>siponimod,<br>sulfamethoxazol,<br>tetrahydrocannabinol,<br>torasemide,<br><b>valproïnezuur,</b><br>valsartan,<br>vismodegib,<br><b>warfarine</b> | ivacaftor,<br><b>miconazol,</b><br>noscapine,<br>sulfamethoxazol,<br>tegafur,<br><b>voriconazol</b>                                                                                                                                                                                                                        | letermovir,<br><b>primidon,</b><br><b>rifampicine,</b><br>ritonavir                                                                                                 |
| <b>CYP2C19</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abrocitinib,<br/>ambrisentan,<br/><b>brivaracetam,</b><br/>cannabidiol,<br/><b>citalopram,</b><br/>clopidogrel<br/>(prodrug), co-<br/>trimoxazol,<br/>diazepam,<br/><b>escitalopram,</b><br/>esomeprazol,<br/>etravirine,<br/><b>fedratinib,</b><br/><b>fenobarbital,</b><br/><b>fenytoïne,</b><br/>fluconazol,<br/>labetalol,<br/>lansoprazol,<br/>leflunomide,<br/>mavacamten,<br/>moclobemide,</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cenobamaat,<br/>esomeprazol,<br/>etravirine,<br/>fedratinib,<br/><b>fluconazol,</b><br/>fluoxetine,<br/><b>fluvoxamine,</b><br/>givosiran,<br/>isoniazide,<br/>moclobemide,<br/>modafinil,<br/>omeprazol,<br/><b>ticlopidine,</b><br/>topiramaat,<br/><b>voriconazol</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Apalutamide,</b><br/>efavirenz,<br/><b>enzalutamide,</b><br/>ivosidenib,<br/>letemovir,<br/><b>rifampicine</b></li> </ul> |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | omeprazol,<br>pantoprazol,<br><b>pentamidine</b> ,<br>proguanil,<br>rabeprazol,<br>sertraline,<br>terbinafine,<br><b>thalidomide</b> ,<br>ticlopidine,<br>trimethoprim,<br><b>valproïnezuur</b> ,<br><b>voriconazol</b> ,<br>zonisamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| CYP2D6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Almotriptan,<br/>amitriptyline,<br/>aripiprazol,<br/>atomoxetine,<br/>carvedilol,<br/>clomipramine,<br/>clonidine,<br/><b>clozapine</b>, <b>codeïne</b><br/>(prodrug),<br/>dapoxetine,<br/>darifenacine,<br/>dextromethorfan,<br/>difenhydramine,<br/><b>dihydrocodeïne</b>,<br/><b>donepezil</b>,<br/>duloxetine,<br/>eliglustat,<br/><b>ethylmorphine</b><br/>(prodrug),<br/>fingolimod,<br/><b>flecainide</b>,<br/>fluoxetine,<br/>fluvoxamine,<br/>galantamine,<br/><b>haloperidol</b>,<br/>imipramine,<br/>metoclopramide,<br/>metoprolol,<br/>mianserine,<br/>nebivolol,<br/>nortriptyline,<br/><b>oxycodon</b>,<br/>paliperidon,<br/>palonosetron,<br/>paroxetine,<br/><b>pitolisant</b>,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abirateron,<br/>amiodaron,<br/>berotralsat,<br/><b>bupropion</b>,<br/>celecoxib,<br/><b>cinacalcet</b>,<br/>citalopram,<br/>cobicistat,<br/>difenhydramine,<br/>duloxetine,<br/>escitalopram,<br/>fedratinib,<br/><b>fluoxetine</b>,<br/>fluvoxamine,<br/>givosiran,<br/><b>mirabegron</b>,<br/>moclobemide,<br/>panobinostat,<br/><b>paroxetine</b>,<br/>pitolisant,<br/><b>propafenon</b>,<br/>ranolazine,<br/><b>ritonavir</b>,<br/>sertraline,<br/><b>terbinafine</b>,<br/>vemurafenib,<br/>venlafaxine</li> </ul> |  |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>promethazine,<br/> <b>propafenon</b>,<br/>         propranolol,<br/>         ranolazine,<br/>         remdesivir,<br/>         risperidon,<br/> <b>sertindol</b>,<br/>         tamoxifen<br/>         (prodrug),<br/>         tamsulosine,<br/>         tetrabenazine,<br/>         timolol,<br/>         tolterodine,<br/> <b>tramadol</b>,<br/>         venlafaxine,<br/>         vortioxetine,<br/>         yohimbine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CYP3A4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Abemaciclib</b>,<br/>           abirateron,<br/> <b>acalabrutinib</b>,<br/> <b>alectinib</b>,<br/> <b>alfentanil</b>,<br/>           alfuzosine,<br/>           almotriptan,<br/>           alpelisib,<br/>           alprazolam,<br/>           ambrisentan,<br/> <b>amiodaron</b>,<br/>           amlodipine,<br/> <b>anastrozol</b>,<br/> <b>apixaban</b>,<br/>           apremilast,<br/>           aprepitant,<br/>           aripiprazol,<br/> <b>artemether</b>,<br/> <b>asciminib</b>,<br/> <b>atazanavir</b>,<br/>           atogepant,<br/>           atorvastatine,<br/>           avanafil,<br/>           avatrombopag,<br/> <b>axitinib</b>,<br/> <b>bedaquiline</b>,<br/>           betamethason,<br/> <b>bexaroteen</b>,<br/>           bicteggravir,<br/> <b>bortezomib</b>,<br/>           bosentan,<br/> <b>bosutinib</b>,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acalabrutinib,<br/>           amiodaron,<br/>           aprepitant (tijdens<br/>           de 3 dagen<br/>           durende<br/>           behandeling),<br/>           asciminib,<br/>           atazanavir,<br/>           berotralsat,<br/>           capivasertib,<br/>           ceritinib,<br/>           ciprofloxacin,<br/> <b>clarithromycine</b>,<br/> <b>cobicistat</b>,<br/>           crizotinib,<br/>           darunavir,<br/>           diltiazem,<br/>           entrectinib,<br/> <b>erythromycine</b>,<br/>           fedratinib,<br/>           fluconazol,<br/>           fluoxetine,<br/>           fluvoxamine,<br/>           fosamprenavir,<br/>           fosaprepitant<br/>           (tijdens de 3<br/>           dagen durende<br/>           behandeling),<br/>           givosiran,<br/>           idebenon,<br/> <b>idelalisib</b>, imatinib,<br/>           isavuconazol,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apalutamide</b>,<br/>           aprepitant (na<br/>           afloop van de<br/>           behandeling),<br/>           bosentan,<br/> <b>carbamazepine</b>,<br/>           cenobamaat,<br/> <b>dabrafenib</b>,<br/>           efavirenz,<br/> <b>enzalutamide</b>,<br/>           etravirine,<br/> <b>fenobarbital</b>,<br/> <b>fentytoïne</b>,<br/>           fosaprepitant (na<br/>           afloop van de<br/>           behandeling),<br/>           ivosidenib,<br/>           lorlatinib,<br/> <b>lumacaftor</b>,<br/> <b>mitotaan</b>,<br/>           modafinil,<br/>           nevirapine,<br/>           oxcarbazepine,<br/>           pitolisant,<br/> <b>primidon</b>,<br/> <b>rifabutine</b>,<br/> <b>rifampicine</b>,<br/>           rifamycine,<br/>           rufinamide,<br/>           topiramaat (hoge<br/>           dosis), <b>sint-<br/>           janskruidd</b>,</li> </ul> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>brentuximab</b><br><b>vedotin, brigatinib,</b><br>bromocriptine,<br>budesonide,<br>bupivacaïne,<br><b>buprenorfine,</b><br><b>cabazitaxel,</b><br>cabergoline,<br><b>cabozantinib,</b><br>capivasertib,<br>cannabidiol,<br><b>carbamazepine,</b><br>cariprazine,<br>chloorfenamine,<br>chloormadinon,<br><b>cerinitib,</b><br><b>ciclosporine,</b><br><b>clarithromycine,</b><br>clindamycine,<br>clobazam,<br>clonazepam,<br>clopidogrel,<br>cobicistat,<br><b>cobimetinib,</b><br><b>colchicine,</b> co-<br>trimoxazol,<br><b>crizotinib,</b><br><b>cyclofosfamide,</b><br><b>dabrafenib,</b><br>darifenacine,<br>darolutamide,<br>darunavir,<br><b>dasatinib,</b><br>desfesoterodine,<br>desogestrel,<br>dexamethason,<br>diënogest,<br>dihydro-<br>ergotamine,<br>diltiazem,<br><b>disopyramide,</b><br>disulfiram,<br><b>docetaxel,</b><br>dolutegravir,<br><b>domperidon,</b><br><b>donepezil,</b><br><b>doxorubicine,</b><br><b>droperidol,</b><br>drospirenon, | <b>itraconazol,</b><br>ivacaftor,<br><b>ketoconazol,</b><br>lapatinib,<br>larotrectinib,<br>letermovir,<br>lopinavir,<br>netupitant,<br>nilotinib,<br>pazopanib,<br><b>pompelmoes/pomelo,</b> <b>posaconazol,</b><br>ranolazine,<br>ribociclib,<br>ritlecitinib,<br><b>ritonavir,</b><br>roxithromycine,<br><b>saquinavir,</b><br>selpercatinib,<br>stiripentol,<br>ticagrelor,<br>tipranavir,<br><b>tucatinib,</b><br>verapamil,<br><b>voriconazol</b> | vemurafenib,<br>zanubritinib |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>             dutasteride,<br/>             ebastine, elbasvir,<br/>             eletriptan,<br/>             elexacaftor,<br/>             eliglustat,<br/>             elvitegravir,<br/> <b>encorafenib</b>,<br/> <b>enfortumab</b><br/> <b>vedotin</b>,<br/> <b>entrectinib</b>,<br/>             eplerenon,<br/>             eravacycline,<br/>             ergotamine,<br/> <b>erlotinib</b>,<br/> <b>erythromycine</b>,<br/>             esketamine,<br/>             estradiol, estriol,<br/>             ethinylestradiol,<br/> <b>ethosuximide</b>,<br/>             etonogestrel,<br/> <b>etoposide</b>,<br/>             etrasimod,<br/> <b>everolimus</b>,<br/> <b>exemestan</b>,<br/> <b>fedratinib</b>,<br/>             felodipine,<br/> <b>fentanyl</b>,<br/>             fesoterodine,<br/>             finasteride,<br/>             finerenon,<br/>             fingolimod,<br/>             flurazepam,<br/>             fluticason,<br/>             fosamprenavir,<br/>             fosaprepitant,<br/> <b>fostemsavir</b>,<br/>             galantamine,<br/> <b>gefitinib</b>,<br/>             gestodeen,<br/> <b>gilteritinib</b>,<br/>             granisetron,<br/>             grazoprevir,<br/> <b>guanfacine</b>,<br/> <b>haloperidol</b>,<br/>             hydrocortison,<br/> <b>ibrutinib</b>,<br/> <b>idelalisib</b>,<br/> <b>ifosfamide</b>,<br/> <b>imatinib</b>,           </p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | indacaterol,<br><b>irinotecan</b> ,<br>isavuconazol,<br>isradipine,<br><b>itraconazol</b> ,<br>ivabradine,<br>ivacaftor,<br>ivermectine,<br>ivosidenib,<br><b>ixazomib</b> ,<br>ketamine,<br>ketoconazol,<br><b>kinidine</b> , <b>kinine</b> ,<br><b>lapatinib</b> ,<br>lansoprazol,<br><b>larotrectinib</b> ,<br><b>lenvatinib</b> ,<br>lercanidipine,<br><b>letrozol</b> ,<br>levonorgestrel,<br>lidocaïne,<br>loperamide,<br><b>lopinavir</b> ,<br>loratadine,<br><b>lorlatinib</b> ,<br><b>lumefantrine</b> ,<br>macitentan,<br>maraviroc,<br>maribavir,<br>mavacamten,<br>mefloquine,<br><b>methadon</b> ,<br>methylprednisolone,<br>midazolam,<br><b>midostaurine</b> ,<br>mifepriston,<br>mirabegron,<br>modafinil,<br>mometason,<br>naldemedine,<br>naloxon,<br>netupitant,<br>nevirapine,<br>nicardipine,<br>nifedipine,<br><b>nilotinib</b> ,<br>nimodipine,<br>nirmatrelvir,<br>nomegestrol, |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | norelgestromin,<br><b>oestrogenen</b> ,<br>oestroprogestagen<br>en, <b>olaparib</b> ,<br><b>osimertinib</b> ,<br>oxybutynine,<br><b>oxycodon</b> ,<br><b>paclitaxel</b> ,<br><b>palbociclib</b> ,<br><b>panobinostat</b> ,<br><b>pazopanib</b> ,<br><b>perampanel</b> ,<br><b>pimozide</b> ,<br><b>pitolisant</b> ,<br><b>ponatinib</b> ,<br>prednison,<br>prednisolon,<br><b>progestagenen</b> ,<br>quetiapine,<br>ranolazine,<br>reboxetine,<br><b>regorafenib</b> ,<br>remdesivir,<br><b>rilpivirine</b> ,<br><b>ribociclib</b> ,<br>rifabutine,<br>rifaximine,<br>rimegepant,<br>riociguat,<br>risperidon,<br>ritonavir,<br><b>rivaroxaban</b> ,<br><b>ruxolitinib</b> ,<br>salmeterol,<br><b>saquinavir</b> ,<br>saxagliptine,<br><b>selpercatinib</b> ,<br><b>sertindol</b> ,<br>sildenafil,<br>silodosine,<br>simvastatine,<br>siponimod,<br><b>sirolimus</b> ,<br>sitagliptine,<br>solifenacine,<br>sonidegib,<br><b>sorafenib</b> ,<br>sufentanil,<br><b>sunitinib</b> , |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>tacrolimus,</b><br>tadalafil,<br><b>tamoxifen,</b><br>tamsulosine,<br>terbinafine,<br><b>temsirolimus,</b><br>testosteron,<br>tezacaftor,<br>ticagrelor,<br><b>thiotepa,</b><br>tiagabine,<br>ticlopidine,<br>tinidazol,<br>tipranavir,<br>tofacitinib,<br>tolterodine,<br>tolvaptan,<br><b>topiramaat,</b><br>trabectedine,<br><b>trastuzumab-</b><br><b>emtansine,</b><br>trazodon,<br>triamcinolon,<br>triazolam,<br>trimethoprim,<br><b>tucatinib,</b><br>ulipristal,<br>upadacitinib,<br><b>vandetanib,</b><br>varденафил,<br>velpatasvir,<br><b>vemurafenib,</b><br><b>venetoclax,</b><br>verapamil,<br>vibegron,<br>vilanterol,<br><b>vinblastine,</b><br><b>vincristine,</b><br><b>vindesine,</b><br><b>vinorelbine,</b><br><b>vismodegib,</b><br>voclosporine,<br><b>voriconazol,</b><br>voxilaprevir,<br>yohimbine,<br><b>zanubrutinib,</b><br>zolpidem,<br>zonisamide,<br>zopiclon |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



**Tabel Id. De substraten, inhibitoren en inductoren van P-glycoproteïne (P-gp)**

De substraten, inhibitoren en inductoren waarvan men verwacht dat ze de klinisch meest relevante interacties zullen geven, zijn in vetjes aangeduid. Uiteraard wil dit niet zeggen dat interacties met niet-vetjes aangeduide geneesmiddelen geen risico inhouden. Voor meer informatie, zie *Inl.6.3*.

| Substraten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inhibitoren<br>(↑<br>substraatplasmaconcentratie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inductoren<br>(↓<br>substraatplasmaconcentratie)                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acalabrutinib</b> , <b>afatinib</b> , <b>alfentanil</b> ,<br>ambrisentan, amisulpride,<br>amitriptyline, <b>apixaban</b> , <b>atazanavir</b> ,<br>atogepant, atorvastatine,<br><b>azithromycine</b> , berotralsat,<br><b>binimetinib</b> , <b>brentuximab vedotin</b> ,<br>budesonide, canagliflozine,<br>carvedilol, <b>ceritinib</b> , cetirizine,<br><b>ciclosporine</b> , <b>citalopram</b> , clopidogrel,<br><b>cobimetinib</b> , <b>colchicine</b> , <b>dabigatran</b> ,<br><b>dabrafenib</b> , darolutamide, <b>dasatinib</b> ,<br><b>daunorubicine</b> , desloratidine,<br>dexamethason, <b>digoxine</b> , diltiazem,<br><b>docetaxel</b> , <b>domperidon</b> ,<br><b>doxorubicine</b> , <b>droperidol</b> , <b>edoxaban</b> ,<br>elbasvir, eletriptan, eliglustat,<br>emtricitabine, <b>erlotinib</b> ,<br><b>erythromycine</b> , ethinylestradiol,<br><b>etoposide</b> , <b>everolimus</b> , <b>fentanyl</b> ,<br>fexofenadine, fidaxomicine,<br><b>fostemsavir</b> , <b>gefitinib</b> , <b>gilteritinib</b> ,<br>glecaprevir, grazoprevir, <b>imatinib</b> ,<br>indacaterol, <b>irinotecan</b> , <b>itraconazol</b> ,<br><b>lapatinib</b> , <b>larotrectinib</b> , ledipasvir,<br><b>lenvatinib</b> , linagliptine, loperamide,<br>loratadine, maraviroc, mefloquine,<br>methylprednisolon, mirabegron,<br><b>mitomycine</b> , <b>morfine</b> , naldemedine,<br>naloxon, <b>nilotinib</b> , <b>niraparib</b> ,<br><b>nintedanib</b> , nortriptyline,<br><b>ondansetron</b> , odevixibat, oseltamivir,<br><b>paclitaxel</b> , paroxetine, pibrentasvir,<br><b>pralsetinib</b> , <b>pomalidomide</b> ,<br><b>posaconazol</b> , prednison, raltegravir,<br>ranolazine, relugolix, remdesivir,<br>rifaximine, rifampicine, rimegepant,<br>riociguat, risperidon, ritonavir,<br><b>rivaroxaban</b> , <b>saquinavir</b> , saxagliptine,<br>sertraline, silodosine, <b>sirolimus</b> ,<br>sitagliptine, sofosbuvir, <b>sorafenib</b> ,<br><b>sunitinib</b> , <b>tacrolimus</b> , <b>talazoparib</b> ,<br><b>temsirolimus</b> , tenofovir, <b>tepotinib</b> ,<br>ticagrelor, tipranavir, tolaptan, | <b>Amiodaron</b> , azithromycine,<br>berotralsat, <b>ciclosporine</b> ,<br><b>clarithromycine</b> , diltiazem,<br>erythromycine, glecaprevir,<br>idebenon, isavuconazol, <b>itraconazol</b> ,<br>ivacaftor, ivosidenib, <b>ketoconazol</b> ,<br><b>lapatinib</b> , ledipasvir, maribavir,<br>pibrentasvir, propafenon, ranolazine,<br><b>ritonavir</b> , <b>saquinavir</b> , <b>tepotinib</b> ,<br>ticagrelor, tucatinib, vandetanib,<br>velpatasvir, venetoclax, <b>verapamil</b> ,<br>vibegron, voclosporine, voxilaprevir | Carbamazepine, ivosidenib,<br>lorlatinib, <b>rifampicine</b> , <b>sint-janskruid</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>topotecan, trabectedine, tucatinib,</b><br>umeclidinium, velpatasvir, vibegron,<br><b>venetoclax,</b> venlafaxine, verapamil,<br>vilanterol, <b>vinblastine, vincristine,</b><br><b>vinorelbine, vismodegib,</b> voxilaprevir |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Tabel 1e. (Alfabetische lijst van substraten, inhibitoren en inductoren van de CYP-iso-enzymen en van P-gp)**

De substraten, inhibitoren en inductoren waarvan men verwacht dat ze de klinisch meest relevante interacties zullen geven, zijn in vetjes aangeduid. Uiteraard wil dit niet zeggen dat interacties met niet-vetjes aangeduide geneesmiddelen geen risico inhouden. Voor meer informatie, zie Inl.6.3.

|               | Substraat van   | Inhibitor van                                | Inductor van                           |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| abemaciclib   | <b>3A4</b>      |                                              |                                        |
| abirateron    | 3A4             | 2D6                                          |                                        |
| abrocitinib   | 2C9 2C19        |                                              |                                        |
| acalabrutinib | <b>3A4 P-gp</b> | 3A4                                          | 1A2                                    |
| acenocoumarol | <b>2C9</b>      |                                              |                                        |
| afatinib      | <b>P-gp</b>     |                                              |                                        |
| agomelatine   | 1A2             |                                              |                                        |
| alectinib     | <b>3A4</b>      |                                              |                                        |
| alfentanil    | <b>3A4 P-gp</b> |                                              |                                        |
| alfuzosine    | 3A4             |                                              |                                        |
| almotriptan   | 2D6 3A4         |                                              |                                        |
| alpelisib     | <b>3A4</b>      |                                              |                                        |
| alprazolam    | 3A4             |                                              |                                        |
| ambrisentan   | 2C19 3A4 P-gp   |                                              |                                        |
| amiodaron     | <b>2C8 3A4</b>  | 2C9 2D6 3A4 <b>P-gp</b>                      |                                        |
| amisulpiride  | P-gp            |                                              |                                        |
| amitriptyline | 1A2 2D6 P-gp    |                                              |                                        |
| amlodipine    | 3A4             |                                              |                                        |
| anagrelide    | <b>1A2</b>      |                                              |                                        |
| anastrozol    | 3A4             |                                              |                                        |
| apalutamide   |                 |                                              | 2C9 <b>2C19 3A4</b>                    |
| apixaban      | <b>3A4 P-gp</b> |                                              |                                        |
| apremilast    | 3A4             |                                              |                                        |
| aprepitant    | 3A4             | 3A4 (tijdens de 3 dagen durende behandeling) | 2C9 3A4 (na afloop van de behandeling) |
| aripiprazol   | 2D6 3A4         |                                              |                                        |
| artemether    | <b>3A4</b>      |                                              |                                        |



|                     |                 |              |         |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| asciminib           | <b>3A4</b>      | 3A4 2C9      |         |
| asenapine           | 1A2             | 3A4          |         |
| atazanavir          | <b>3A4 P-gp</b> |              |         |
| atogepant           | 3A4 P-gp        |              |         |
| atomoxetine         | 2D6             |              |         |
| atorvastatine       | 3A4 P-gp        |              |         |
| avanafil            | 3A4             |              |         |
| avatrombopag        | 2C9 3A4         |              |         |
| axitinib            | <b>3A4</b>      |              |         |
| azithromycine       | <b>P-gp</b>     | P-gp         |         |
| bedaquiline         | <b>3A4</b>      |              |         |
| bendamustine        | <b>1A2</b>      |              |         |
| berotralstat        | P-gp            | 2D6 3A4 P-gP |         |
| betamethason        | 3A4             |              |         |
| bexarotene          | <b>3A4</b>      |              |         |
| bictegravir         | 3A4             |              |         |
| binimetinib         | <b>P-gp</b>     |              |         |
| bortezomib          | <b>3A4</b>      |              |         |
| bosentan            | 2C9 3A4         |              | 2C9 3A4 |
| bosutinib           | <b>3A4</b>      |              |         |
| brentuximab vedotin | <b>3A4 P-gp</b> |              |         |
| brigatinib          | <b>3A4</b>      |              |         |
| brivaracetam        | <b>2C19</b>     |              |         |
| bromocriptine       | 3A4             |              |         |
| budesonide          | 3A4 P-gp        |              |         |
| bupivacaïne         | 3A4             |              |         |
| buprenorfine        | <b>3A4</b>      |              |         |
| bupropion           | 2B6             | <b>2D6</b>   |         |
| cabazitaxel         | <b>3A4</b>      |              |         |
| cabergoline         | 3A4             |              |         |
| cabozantinib        | <b>3A4</b>      |              |         |
| canagliflozine      | P-gp            |              |         |
| candesartan         | 2C9             |              |         |
| cannabidiol         | 2C19, 3A4       |              |         |



|                       |                     |                 |                             |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| capivasertib          | 3A4                 | 3A4             |                             |
| capecitabine          |                     | 2C9             |                             |
| carbamazepine         | <b>2C8 3A4</b>      |                 | <b>1A2 2B6 2C9 3A4 P-gp</b> |
| cariprazine           | 3A4                 |                 |                             |
| carvedilol            | 2C9 2D6 P-gp        |                 |                             |
| celecoxib             | 2C9                 | 2D6             |                             |
| cenobamate            |                     | 2C19            | 2B6 3A4                     |
| ceritinib             | <b>3A4 P-gp</b>     | 2C9 3A4         |                             |
| cetirizine            | P-gp                |                 |                             |
| chloorfenamine        | 3A4                 |                 |                             |
| chloormadinon         | 3A4                 |                 |                             |
| ciclosporine          | <b>3A4 P-gp</b>     | <b>P-gp</b>     |                             |
| cinacalcet            |                     | <b>2D6</b>      |                             |
| ciprofloxacin         |                     | 1A2 3A4         |                             |
| citalopram            | <b>2C19 P-gp</b>    | 2D6             |                             |
| clarithromycin        | <b>3A4</b>          | <b>3A4 P-gp</b> |                             |
| clindamycin           | 3A4                 |                 |                             |
| clobazam              | 3A4                 |                 |                             |
| clomipramine          | 1A2 2D6             |                 |                             |
| clonazepam            | 2C8 3A4             |                 |                             |
| clonidine             | 2D6                 |                 |                             |
| clopidogrel (prodrug) | 2C19 3A4 P-gp       | 2B6 <b>2C8</b>  |                             |
| clozapine             | <b>1A2 2D6</b>      |                 |                             |
| cobicistat            | 3A4                 | 2D6 <b>3A4</b>  |                             |
| cobimetinib           | <b>3A4 P-gp</b>     |                 |                             |
| codeïne (prodrug)     | <b>2D6</b>          |                 |                             |
| coffeïne              | 1A2                 | 1A2             |                             |
| colchicine            | <b>3A4 P-gp</b>     |                 |                             |
| co-trimoxazol         | 2C9 2C19 3A4        | 2C8 2C9         |                             |
| crizotinib            | <b>3A4</b>          | 3A4             |                             |
| cyclofosfamide        | <b>2B6, 3A4</b>     |                 |                             |
| dabigatran            | <b>P-gp</b>         |                 |                             |
| dabrafenib            | <b>2C8 3A4 P-gp</b> |                 | 2C9, <b>3A4</b>             |
| dacarbazine           | <b>1A2</b>          |                 |                             |



|                    |                 |          |              |
|--------------------|-----------------|----------|--------------|
| dapoxetine         | 2D6             |          |              |
| darifenacine       | 2D6 3A4         |          |              |
| darunavir          | 3A4             | 3A4      |              |
| darolutamide       | 3A4 P-gp        |          |              |
| dasatinib          | <b>3A4 P-gp</b> |          |              |
| daunorubicine      | <b>P-gp</b>     |          |              |
| deferasirox        | 1A2             | 1A2 2C8  |              |
| desfesoterodine    | 3A4             |          |              |
| desloratadine      | P-gp            |          |              |
| desogestrel        | 3A4             |          |              |
| dexamethason       | 3A4 P-gp        |          |              |
| dextromethorfan    | 2D6             |          |              |
| diazepam           | 2C19            |          |              |
| diclofenac         | 2C9             |          |              |
| diënogest          | 3A4             |          |              |
| difenhydramine     | 2D6             | 2D6      |              |
| digoxine           | <b>P-gp</b>     |          |              |
| dihydro-ergotamine | 3A4             |          |              |
| dihydrocodeïne     | <b>2D6</b>      |          |              |
| disufiram          | 3A4             |          |              |
| diltiazem          | 3A4             | 3A4 P-gp |              |
| disopyramide       | <b>3A4</b>      |          |              |
| docetaxel          | <b>3A4 P-gp</b> |          |              |
| dolutegravir       | 3A4             |          |              |
| domperidon         | <b>3A4 P-gp</b> |          |              |
| donepezil          | <b>2D6 3A4</b>  |          |              |
| doxorubicine       | <b>3A4 P-gp</b> |          |              |
| droperidol         | <b>3A4 P-gp</b> |          |              |
| drospirenon        | 3A4             |          |              |
| duloxetine         | 1A2 2D6         | 2D6      |              |
| dutasteride        | 3A4             |          |              |
| ebastine           | 3A4             |          |              |
| edoxaban           | <b>P-gp</b>     |          |              |
| efavirenz          | 2B6             |          | 2B6 2C19 3A4 |



|                         |                 |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| elbasvir                | 3A4 P-gp        |                 |                     |
| eletriptan              | 3A4 P-gp        |                 |                     |
| elexacaftor             | 3A4             |                 |                     |
| eliglustat              | 2D6 3A4 P-gp    |                 |                     |
| elvitegravir            | 3A4             |                 |                     |
| emtricitabine           | P-gp            |                 |                     |
| encorafenib             | <b>3A4</b>      |                 |                     |
| enfortumab vedotin      | <b>3A4</b>      |                 |                     |
| entrectinib             | <b>3A4</b>      | 3A4             |                     |
| enzalutamide            | <b>2C8</b>      |                 | 2C9 <b>2C19 3A4</b> |
| eplerenon               | 3A4             |                 |                     |
| eravacycline            | 3A4             |                 |                     |
| ergotamine              | 3A4             |                 |                     |
| erlotinib               | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                     |
| erythromycine           | <b>3A4 P-gp</b> | <b>3A4 P-gp</b> |                     |
| escitalopram            | <b>2C19</b>     | 2D6             |                     |
| esketamine              | 3A4             |                 |                     |
| esomeprazol             | 2C19            | 2C19            |                     |
| estradiol               | 3A4             |                 |                     |
| estriol                 | 3A4             |                 |                     |
| ethinylestradiol        | 3A4 P-gp        | 1A2             |                     |
| ethosuximide            | <b>3A4</b>      |                 |                     |
| ethylmorphine (prodrug) | <b>2D6</b>      |                 |                     |
| etonogestrel            | 3A4             |                 |                     |
| etoposide               | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                     |
| etrasimod               | 2C8 2C9 3A4     |                 |                     |
| etravirine              | 2C19            | 2C19            | 3A4                 |
| everolimus              | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                     |
| exemestan               | <b>3A4</b>      |                 |                     |
| fedratinib              | <b>3A4</b>      | 2C19 2D6 3A4    |                     |
| felodipine              | 3A4             |                 |                     |
| fenobarbital            | <b>2C9 2C19</b> |                 | <b>1A2 2C9 3A4</b>  |
| fenprocoumon            | <b>2C9</b>      |                 |                     |
| fentanyl                | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                     |



|                    |                 |                                              |                                       |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| fenytoïne          | <b>2C9 2C19</b> |                                              | <b>1A2 2C9 3A4</b>                    |
| fesoterodine       | 3A4             |                                              |                                       |
| fexofenadine       | P-gp            |                                              |                                       |
| fezolinetant       | 1A2             |                                              |                                       |
| fidaxomicine       | P-gp            |                                              |                                       |
| finasteride        | 3A4             |                                              |                                       |
| finerenon          | 3A4             |                                              |                                       |
| fingolimod         | 2D6 3A4         |                                              |                                       |
| flecainide         | <b>1A2 2D6</b>  |                                              |                                       |
| fluconazol         | 2C9, 2C19       | <b>2C9 2C19</b> 3A4                          |                                       |
| fluoxetine         | 2D6             | 2C9 2C19 <b>2D6</b> 3A4                      |                                       |
| fluorouracil       |                 | 2C9                                          |                                       |
| flurazepam         | 3A4             |                                              |                                       |
| flurbiprofen       | 2C9             |                                              |                                       |
| flutamide          | 1A2             |                                              |                                       |
| fluticason         | 3A4             |                                              |                                       |
| fluvastatine       | 2C8 2C9         | 2C9                                          |                                       |
| fluvoxamine        | 2D6             | <b>1A2</b> 2C9 <b>2C19</b> 2D6 3A4           |                                       |
| fosamprenavir      | 3A4             | 3A4                                          |                                       |
| fosaprepitant      | 3A4             | 3A4 (tijdens de 3 dagen durende behandeling) | 2C9 3A4(na afloop van de behandeling) |
| <b>fostemsavir</b> | <b>3A4 P-gp</b> |                                              |                                       |
| frovatriptan       | 1A2             |                                              |                                       |
| galantamine        | 2D6 3A4         |                                              |                                       |
| gefitinib          | <b>3A4</b>      |                                              |                                       |
| gestodeen          | 3A4             |                                              |                                       |
| gilteritinib       | <b>3A4 P-gp</b> |                                              |                                       |
| givosiran          |                 | 1A2 2C19 2D6 3A4                             |                                       |
| glecaprevir        | P-gp            | P-gp                                         |                                       |
| glibenclamide      | <b>2C9</b>      |                                              |                                       |
| gliclazide         | <b>2C9</b>      |                                              |                                       |
| glimepiride        | <b>2C9</b>      |                                              |                                       |
| glipizide          | <b>2C9</b>      |                                              |                                       |
| gliquidon          | <b>2C9</b>      |                                              |                                       |



|               |                     |                    |                           |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| granisetron   | 3A4                 |                    |                           |
| grazoprevir   | 3A4 P-gp            |                    |                           |
| guanfacine    | <b>3A4</b>          |                    |                           |
| haloperidol   | <b>2D6 3A4</b>      |                    |                           |
| hydrocortison | 3A4                 |                    |                           |
| ibuprofen     | 2C8 2C9             |                    |                           |
| ibrutinib     | <b>3A4</b>          |                    |                           |
| idebenon      |                     | 3A4 P-gp           |                           |
| idelalisib    | <b>3A4</b>          | <b>3A4</b>         |                           |
| ifosfamide    | <b>3A4 2B6</b>      |                    |                           |
| imatinib      | <b>2C8 3A4 P-gp</b> | 3A4                |                           |
| imipramine    | 1A2 2D6             |                    |                           |
| indacaterol   | 3A4 P-gp            |                    |                           |
| indometacine  | 2C9                 |                    |                           |
| irbesartan    | 2C9                 |                    |                           |
| irinotecan    | <b>3A4 P-gp</b>     |                    |                           |
| isavuconazol  | 3A4                 | 3A4 P-gp           |                           |
| isoniazide    |                     | 2C19               |                           |
| isradipine    | 3A4                 |                    |                           |
| itraconazol   | <b>3A4 P-gp</b>     | <b>3A4 P-gp</b>    |                           |
| ivabradine    | 3A4                 |                    |                           |
| ivacaftor     | 3A4                 | 2C9 3A4 P-gp       |                           |
| ivermectine   | 3A4                 |                    |                           |
| ivosidenib    | 3A4                 | P-gp               | 2B6 2C8 2C9 2C19 3A4 P-gp |
| ixazomib      | <b>3A4</b>          |                    |                           |
| ketamine      | 3A4                 |                    |                           |
| ketoconazol   | 3A4                 | <b>3A4 P-gp</b>    |                           |
| kinidine      | <b>3A4</b>          |                    |                           |
| kinine        | <b>3A4</b>          |                    |                           |
| labetalol     | 2C19                |                    |                           |
| lansoprazol   | 2C19 3A4            |                    |                           |
| lapatinib     | <b>3A4 P-gp</b>     | CYP3A4 <b>P-gp</b> |                           |
| larotrectinib | <b>3A4 P-gp</b>     | CYP3A4             |                           |



|                   |                 |            |            |
|-------------------|-----------------|------------|------------|
| ledipasvir        | P-gp            | P-gp       |            |
| leflunomide       | 1A2 2C19        |            |            |
| lenvatinib        | <b>3A4 P-gp</b> |            |            |
| lercanidipine     | 3A4             |            |            |
| letermovir        |                 | 3A4        | 2C9, 2C19  |
| letrozol          | <b>3A4</b>      |            |            |
| levonorgestrel    | 3A4             |            |            |
| lidocaïne         | 1A2, 3A4        |            |            |
| linagliptine      | P-gp            |            |            |
| linzagolix        |                 | 2C8        |            |
| loperamide        | 2C8 3A4 P-gp    |            |            |
| lopinavir         | <b>3A4</b>      | 3A4        |            |
| loratidine        | 3A4 P-gp        |            |            |
| lorlatinib        | <b>3A4</b>      |            | 3A4 P-gp   |
| losartan          | 2C9             |            |            |
| lumacaftor        |                 |            | <b>3A4</b> |
| lumefantrine      | <b>3A4</b>      |            |            |
| macitentan        | 3A4             |            |            |
| maraviroc         | 3A4 P-gp        |            |            |
| maribavir         | 3A4             | P-gp       |            |
| mavacamten        | 2C19 3A4        |            |            |
| mefloquine        | 3A4 P-gp        |            |            |
| melatonine        | 1A2             |            |            |
| meloxicam         | 2C9             |            |            |
| methadon          | <b>2B6 3A4</b>  |            |            |
| methoxsaleen      |                 | 1A2        |            |
| methylprednisolon | 3A4 P-gp        |            |            |
| metoclopramide    | 2D6             |            |            |
| metoprolol        | 2D6             |            |            |
| mianserine        | 2D6             |            |            |
| miconazol         |                 | <b>2C9</b> |            |
| midazolam         | 3A4             |            |            |
| midostaurine      | <b>3A4</b>      |            |            |
| mifepriston       | 3A4             |            |            |



|                     |                 |            |            |
|---------------------|-----------------|------------|------------|
| mirabegron          | 3A4 P-gp        | <b>2D6</b> |            |
| mitomycine          | <b>P-gp</b>     |            |            |
| mitotaan            |                 |            | <b>3A4</b> |
| moclobemide         | 2C19            | 2C19 2D6   |            |
| modafinil           | 3A4             | 2C19       | 3A4        |
| mometason           | 3A4             |            |            |
| montelukast         | 2C8             |            |            |
| morfine             | <b>P-gp</b>     |            |            |
| naldemedine         | 3A4 P-gp        |            |            |
| naloxon             | 3A4 P-gp        |            |            |
| naproxen            | 2C9             |            |            |
| nebivolol           | 2D6             |            |            |
| netupitant          | 3A4             | 3A4        |            |
| nevirapine          | 2B6 3A4         |            | 3A4        |
| nicardipine         | 3A4             |            |            |
| nifedipine          | 3A4             |            |            |
| nilotinib           | <b>3A4 P-gp</b> | 3A4        |            |
| nimodipine          | 3A4             |            |            |
| nintedanib          | <b>P-gp</b>     |            |            |
| niraparib           | <b>P-gp</b>     |            |            |
| nirmatrelvir        | 3A4             |            |            |
| nitisinon           | 2C9             |            |            |
| nomegestrol         | 3A4             |            |            |
| norelgestromin      | 3A4             |            |            |
| norfloxacin         |                 | 1A2        |            |
| nortriptyline       | 2D6 P-gp        |            |            |
| noscapine           |                 | 2C9        |            |
| odevixibat          | P-gp            |            |            |
| oestrogenen         | <b>3A4</b>      | 1A2        |            |
| oestroprogestagenen | <b>3A4</b>      | 1A2        |            |
| olanzapine          | 1A2             |            |            |
| olaparib            | <b>3A4</b>      |            |            |
| omeprazol           | 2C19            | 2C19       |            |
| ondansetron         | <b>1A2 P-gp</b> |            |            |



|               |                     |            |                    |
|---------------|---------------------|------------|--------------------|
| oseltamivir   | P-gp                |            |                    |
| osimertinib   | <b>3A4</b>          |            |                    |
| ozanimod      | 2C8                 |            |                    |
| oxcarbazepine |                     |            | 3A4                |
| oxybutynine   | 3A4                 |            |                    |
| oxycodon      | <b>2D6 3A4</b>      |            |                    |
| paclitaxel    | <b>2C8 3A4 P-gp</b> |            |                    |
| palbociclib   | <b>3A4</b>          |            |                    |
| panobinostat  | <b>3A4</b>          | 2D6        |                    |
| paliperidon   | 2D6                 |            |                    |
| palonosetron  | 2D6                 |            |                    |
| pantoprazol   | 2C19                |            |                    |
| paroxetine    | 2D6 P-gp            | <b>2D6</b> |                    |
| pazopanib     | <b>3A4</b>          | 3A4        |                    |
| pentamidine   | <b>2C19</b>         |            |                    |
| perampanel    | <b>3A4</b>          |            |                    |
| pibrentasvir  | P-gp                | P-gp       |                    |
| pimozide      | <b>3A4</b>          |            |                    |
| pioglitazon   | 2C8                 |            |                    |
| pirfenidon    | 1A2                 |            |                    |
| piroxicam     | 2C9                 |            |                    |
| pitolisant    | <b>3A4 2D6</b>      | 2D6        | 3A4                |
| pomalidomide  | <b>1A2 P-gp</b>     |            |                    |
| pomelo        |                     | <b>3A4</b> |                    |
| pompelmoes    |                     | <b>3A4</b> |                    |
| ponatinib     | <b>3A4</b>          |            |                    |
| posaconazol   | <b>P-gp</b>         | <b>3A4</b> |                    |
| pralsetinib   | <b>P-gp</b>         |            |                    |
| prednison     | 3A4 P-gp            |            |                    |
| prednisolon   | 3A4                 |            |                    |
| primidon      |                     |            | <b>1A2 2C9 3A4</b> |
| progestagenen | <b>3A4</b>          |            |                    |
| proguanil     | 2C19                |            |                    |
| promethazine  | 2D6                 |            |                    |



|                |                 |                     |                                      |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| propafenon     | <b>2D6</b>      | 1A2 <b>2D6</b> P-gp |                                      |
| propofol       | <b>2B6</b>      |                     |                                      |
| propranolol    | 2D6             |                     |                                      |
| quetiapine     | 3A4             |                     |                                      |
| rabeprazol     | 2C19            |                     |                                      |
| raltegravir    | P-gp            |                     |                                      |
| ranolazine     | 2D6 3A4 P-gp    | 2D6 3A4 P-gp        |                                      |
| rasagiline     | 1A2             |                     |                                      |
| repaglinide    | <b>2C8</b>      |                     |                                      |
| reboxetine     | 3A4             |                     |                                      |
| regorafenib    | <b>3A4</b>      |                     |                                      |
| relugolix      | P-gp            |                     |                                      |
| remdesivir     | 2C8 2D6 3A4     |                     |                                      |
| ribociclib     | <b>3A4</b>      | 3A4                 |                                      |
| rifabutine     | 3A4             |                     | 3A4                                  |
| rifampicine    | P-gp            |                     | <b>1A2 2B6 2C8 2C9 2C19 3A4 P-gp</b> |
| rifamycine     |                 |                     | 3A4                                  |
| rifaximine     | 3A4 P-gp        |                     |                                      |
| riluzol        | 1A2             |                     |                                      |
| rilpivirine    | <b>3A4</b>      |                     |                                      |
| rimegepant     | 3A4 P-gp        |                     |                                      |
| riociguat      | 2C8 3A4 P-gp    |                     |                                      |
| risperidon     | 2D6 3A4 P-gp    |                     |                                      |
| ritlecitinib   | 1A2 3A4         |                     |                                      |
| ritonavir      | 3A4 P-gp        | <b>2D6 3A4 P-gp</b> | 2B6 2C9                              |
| rivaroxaban    | <b>3A4 P-gp</b> |                     |                                      |
| ropinirol      | 1A2             |                     |                                      |
| ropivacaïne    | 1A2             |                     |                                      |
| rosuvastatine  | 2C9             |                     |                                      |
| roxadustat     | 2C8             |                     |                                      |
| roxithromycine |                 | 3A4                 |                                      |
| rufinamide     |                 |                     | 3A4                                  |
| ruxolitinib    | <b>3A4</b>      |                     |                                      |



|                     |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| salmeterol          | 3A4             |                 |                 |
| saquinavir          | <b>3A4 P-gp</b> | <b>3A4 P-gp</b> |                 |
| saxagliptine        | 3A4 P-gp        |                 |                 |
| selexipag           | 2C8             |                 |                 |
| selpercatinib       | <b>3A4</b>      | 2C8 3A4         |                 |
| sertindol           | <b>2D6 3A4</b>  |                 |                 |
| sertraline          | 2C19 P-gp       | 2D6             |                 |
| sigarettenrook      |                 |                 | 1A2             |
| sildenafil          | 3A4             |                 |                 |
| silodosine          | 3A4 P-gp        |                 |                 |
| simvastatine        | 3A4             |                 |                 |
| sint-janskruid      |                 |                 | <b>3A4 P-gp</b> |
| siponimod           | 2C9 3A4         |                 |                 |
| sirolimus           | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                 |
| sitagliptine        | 3A4 P-gp        |                 |                 |
| sofosbuvir          | P-gp            |                 |                 |
| solifenacine        | 3A4             |                 |                 |
| sonidegib           | <b>3A4</b>      |                 |                 |
| sorafenib           | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                 |
| stiripentol         |                 | 1A2 3A4         |                 |
| sufentanil          | 3A4             |                 |                 |
| sulfamethoxazol     | 2C9             | 2C9             |                 |
| sunitinib           | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                 |
| tacrolimus          | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                 |
| tadalafil           | 3A4             |                 |                 |
| tamoxifen (prodrug) | <b>2D6 3A4</b>  |                 |                 |
| talazoparib         | <b>P-gp</b>     |                 |                 |
| tamsulosine         | 2D6 3A4         |                 |                 |
| tegafur             |                 | 2C9             |                 |
| temsirolimus        | <b>3A4 P-gp</b> |                 |                 |
| tenofovir           | P-gp            |                 |                 |
| tepotinib           | <b>P-gp</b>     | P-gp            |                 |
| terbinafine         | 2C19 3A4        | <b>2D6</b>      |                 |
| teriflunomide       |                 | 2C8             | 1A2             |



|                       |                     |                     |  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| testosteron           | 3A4                 |                     |  |
| tetrabenazine         | 2D6                 |                     |  |
| tetrahydrocannabinol  | 2C9                 |                     |  |
| tezacaftor            | 3A4                 |                     |  |
| thalidomide           | <b>2C19</b>         |                     |  |
| theofylline           | <b>1A2</b>          |                     |  |
| thiotepa              | <b>2B6 3A4</b>      |                     |  |
| tiagabine             | 3A4                 |                     |  |
| ticagrelor            | 3A4 P-gp            | 3A4 P-gp            |  |
| ticlopidine           | 2C19 3A4            | 1A2 2B6 <b>2C19</b> |  |
| timolol               | 2D6                 |                     |  |
| tinidazol             | 3A4                 |                     |  |
| tipranavir            | 3A4 P-gp            | 3A4                 |  |
| tizanidine            | 1A2                 |                     |  |
| tofacitinib           | 3A4                 |                     |  |
| tolterodine           | 2D6 3A4             |                     |  |
| tolvaptan             | 3A4 P-gp            |                     |  |
| topiramaat            | <b>3A4</b>          | 2C19                |  |
| topotecan             | <b>P-gp</b>         |                     |  |
| torasemide            | 2C9                 |                     |  |
| trabectedine          | <b>3A4 P-gp</b>     |                     |  |
| tramadol              | <b>2B6 2D6</b>      |                     |  |
| trastuzumab-emtansine | <b>3A4</b>          |                     |  |
| trazodon              | 3A4                 |                     |  |
| treprostinil          | 2C8                 |                     |  |
| triamcinolon          | 3A4                 |                     |  |
| triazolam             | 3A4                 |                     |  |
| trimethoprim          | 2C19 3A4            | 2C8                 |  |
| tucatinib             | <b>2C8 3A4 P-gp</b> | <b>3A4</b> P-gp     |  |
| ulipristal            | 3A4                 |                     |  |
| umeclidinium          | P-gp                |                     |  |
| upadacitinib          | 3A4                 |                     |  |
| valproïnezuur         | <b>2C9 2C19</b>     |                     |  |
| valsartan             | 2C9                 |                     |  |



|              |                     |                         |     |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----|
| vandetanib   | <b>3A4</b>          | P-gp                    |     |
| vardenafil   | 3A4                 |                         |     |
| velpatasvir  | 3A4 P-gp            | P-gp                    |     |
| vemurafenib  | <b>3A4</b>          | 2D6                     | 3A4 |
| venetoclax   | <b>3A4 P-gp</b>     | P-gp                    |     |
| venlafaxine  | 2D6 P-gp            | 2D6                     |     |
| verapamil    | 3A4 P-gp            | <b>3A4 P-gp</b>         |     |
| vibegron     | 3A4 P-gp            | P-gp                    |     |
| vilanterol   | 3A4 P-gp            |                         |     |
| vinblastine  | <b>3A4 P-gp</b>     |                         |     |
| vincristine  | <b>3A4 P-gp</b>     |                         |     |
| vindesine    | <b>3A4</b>          |                         |     |
| vinorelbine  | <b>3A4 P-gp</b>     |                         |     |
| vismodegib   | <b>2C9 3A4 P-gp</b> |                         |     |
| voriconazol  | <b>2C19 3A4</b>     | 2B6 <b>2C9 2C19 3A4</b> |     |
| vismodegib   | <b>3A4 P-gp</b>     |                         |     |
| voclosporine | 3A4                 | P-gp                    |     |
| vortioxetine | 2D6                 |                         |     |
| voxilaprevir | 3A4 P-gp            | P-gp                    |     |
| warfarine    | <b>1A2 2C9</b>      |                         |     |
| yohimbine    | 2D6 3A4             |                         |     |
| zanubritinib | <b>3A4</b>          |                         | 3A4 |
| zolmitriptan | 1A2                 |                         |     |
| zolpidem     | 3A4                 |                         |     |
| zonisamide   | 2C19 3A4            |                         |     |
| zopiclon     | 2C8 3A4             |                         |     |

## INL. 6.4. Geneesmiddelen bij zwangerschap

- Hieronder vindt u de algemene principes over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Hoe deze algemene principes in het Repertorium worden toegepast, vindt u in *Inl.2.6*.
- *Zie ook Folia december 2006 en Folia februari 2019.*
- **Foliumzuur** wordt pre- en periconceptioneel (tot op het einde van het 1ste trimester) toegediend ter preventie van neuraalbuisdefecten (*zie 14.2.2.6*).
- **Sommige vaccins** worden door de Hoge Gezondheidsraad expliciet aanbevolen aan zwangere vrouwen: vaccin tegen influenza (*zie 12.1.1.5*), vaccin tegen kinkhoest (*zie 12.1.2.3*), vaccin tegen COVID-19 (*zie 12.1.1.16*) en, indien geen eerdere vaccinatie, tetanus-primovaccinatie (*zie 12.1.2.1*). In verband met RSV-vaccinatie van de zwangere vrouw, *zie 12.1.1.18*.



- **Steeds de voor- en nadelen voor moeder en (ongeboren) kind afwegen** indien bij een zwangere vrouw een geneesmiddel werkelijk aangewezen is. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de risico's van het niet behandelen van de moeder voor moeder en kind. In een aantal gevallen zijn de voordelen van (chronische) behandelingen groter dan de mogelijke nadelen (bv bij epilepsie of ernstig astma).
- Waar mogelijk zal men een geneesmiddel kiezen dat reeds sinds lange tijd en frequent gebruikt is en waarvoor geen aanwijzingen voor schadelijkheid zijn naar voren gekomen. Tijdens de zwangerschap worden bijvoorbeeld paracetamol bij koorts en pijn, en penicillines bij infecties als de meest veilige keuze beschouwd. In ieder geval dient steeds gezocht te worden naar de laagst mogelijke effectieve dosis en gestreefd te worden naar de kortst mogelijke behandelingsduur.
- In de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) wordt dikwijls een defensieve houding aangenomen (bv. "niet gebruiken bij gebrek aan voldoende gegevens") en in de SKP's van de verschillende specialiteiten met eenzelfde actief bestanddeel vindt men soms verschillende standpunten voor eenzelfde probleem (gaande van een absolute contra-indicatie tot gebruik "als de verwachte voordelen opwegen tegen het risico"). Het BCFI gebruikt daarom andere bronnen dan de SKP als primaire bron voor de waarschuwingen in het Repertorium (zie *Inl.2.6*).
- **Terminologie.** Met de term "teratogeen" wordt klassiek bedoeld dat er een risico is van structurele aangeboren afwijkingen (ontbreken of verkeerde aanleg van een orgaan), maar meer en meer wordt de term gebruikt voor alle mogelijke negatieve uitkomsten van blootstelling aan een geneesmiddel tijdens de zwangerschap: gaande van structurele aangeboren afwijkingen tot miskraam of doodgeboorte, vroeggeboorte, groeivertraging, farmacologische effecten bij de pasgeborene en ontwikkelingsstoornissen bij het opgroeiende kind.
- **Basisrisico.** Bij elke zwangerschap, dus ook als er geen geneesmiddelen gebruikt worden, is er een risico van 10 tot 15% op een miskraam en een risico van 2 tot 4 % op het krijgen van een baby met aangeboren afwijkingen. De vraag is dan ook of een geneesmiddel dit risico verhoogt.
- **Probleemstelling.** Slechts voor een aantal geneesmiddelen is een nadelig effect op het ongeboren kind onomstotelijk bewezen (zie verder). Voor de meeste geneesmiddelen is de situatie niet duidelijk, en kan de veiligheid niet worden gegarandeerd: er bestaat bijvoorbeeld geen of onvoldoende gedocumenteerde ervaring bij de mens (zeker voor recent geïntroduceerde geneesmiddelen), of er zijn slechts anekdotisch afwijkingen gerapporteerd, wat geen conclusies toelaat. Vaak is er alleen informatie uit dierstudies: deze kan slechts zeer beperkt geëxtrapoleerd worden naar de mens, maar kan wel inzicht geven in de mechanismen van toxiciteit. In het algemeen geldt voor een teratogene stof dat bij een verhoging van de dosering en/of de duur van de behandeling het risico op aangeboren afwijkingen en functionele stoornissen ook toeneemt. Sommige geneesmiddelen of hun metabolieten kunnen schadelijk zijn als ze vóór de conceptie zijn gebruikt. Dit kan het geval zijn bij geneesmiddelen met een lange halfwaardetijd (bv. acitretine, amiodaron).
- De kans op het ontstaan van schade door geneesmiddelen is afhankelijk van **het moment in de zwangerschap waarop het geneesmiddel wordt gebruikt**. Men dient er wel op bedacht te zijn dat embryo/foetotoxische geneesmiddelen met lange halfwaardetijd (bv. acitretine, amiodaron) geruime tijd vóór de conceptie moeten worden gestopt.
  - In het **eerste trimester van de zwangerschap** zijn er twee belangrijke periodes.
    - **Periode tussen de conceptie en volledige implantatie** (periode van ongeveer twee weken na de conceptie, dus tot ongeveer 28 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie). Als er in deze periode blootstelling aan een teratogene stof plaatsvindt, geldt waarschijnlijk altijd een alles-of-niets-principe: ofwel volgt er een miskraam, ofwel een zwangerschap waarbij het basisrisico op een kind met aangeboren afwijkingen hetzelfde is als bij een niet-blootgestelde zwangerschap.
    - **Vervolg van het eerste trimester van de zwangerschap (in principe tot en met 12 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie).** Bij toediening in die periode bestaat voor een aantal geneesmiddelen een bewezen risico van structurele afwijkingen, bijvoorbeeld bepaalde anti-epileptica (met het hoogste risico voor valproïnezuur, maar ook bv. topiramaat), meerdere antitumorale geneesmiddelen, methotrexaat (ook in de lage dosering gebruikt bij inflammatoire



aandoeningen), vitamine K-antagonisten, geslachtshormonen, bepaalde immunosuppressiva (bv. antilymfocyttaire immunoglobulinen, mycofenolzuur, everolimus en sirolimus), misoprostol, de orale retinoïden (bv. acitretine, isotretinoïne), thalidomide (en naar analogie ook lenalidomide en pomalidomide), hooggedoseerd vitamine A, finasteride en dutasteride, en lithium. Voor meer details, zie de rubrieken “Zwangerschap” bij deze geneesmiddelen in het Repertorium.

- Toegediend in de loop van het tweede **trimester (in principe van 13 weken tot en met 26 weken zwangerschap)** en derde trimester (in principe van 27 weken tot en met 40 weken zwangerschap), kunnen sommige geneesmiddelen aanleiding geven tot functionele stoornissen. Het gaat bijvoorbeeld om ACE-inhibitoren, sartanen, vitamine K-antagonisten,  $\beta$ -blokkers, NSAID's, salicylaten, tetracyclines, thyreostatica, amiodaron. Voor meer details, zie de rubrieken “Zwangerschap” bij deze geneesmiddelen in het Repertorium. Bijvoorbeeld, acetylsalicylzuur in hoge dosis en NSAID's zijn gecontra-indiceerd vanaf de 20ste zwangerschapsweek.
- Gebruik in **de laatste weken van de zwangerschap** van benzodiazepines en Z-drugs, opioïden, antidepressiva en antipsychotica kan leiden tot nadelige farmacologische effecten bij de pasgeborene, onder andere onthoudingsverschijnselen. Voor meer details, zie de rubrieken “Zwangerschap” bij deze geneesmiddelen in het Repertorium.
- Bij toediening **kort vóór de bevalling** kunnen geneesmiddelen invloed hebben op de weeën (bv. weeënremmend effect door  $\beta_2$ -mimetica) en het bloedverlies (bv. toename door SSRI's, SNRI's, vortioxetine, acetylsalicylzuur en NSAID's). Voor meer details, zie de rubrieken “Zwangerschap” bij deze geneesmiddelen in het Repertorium.
- Geneesmiddelen die worden toegediend aan de moeder **tijdens de bevalling** kunnen acute problemen stellen bij de pasgeborene. Het gaat bijvoorbeeld om opioïden en lokale en systemische anesthetica. Voor meer details, zie de rubrieken “Zwangerschap” bij deze geneesmiddelen in het Repertorium.
- Er is ook toenemende aandacht voor de mogelijkheid van *behavioural teratology*, d.w.z. langetermijneffecten op de hersenen en het gedrag, bij gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap. Tot nu toe is dit vooral beschreven met bepaalde anti-epileptica (vooral valproïnezuur, fenobarbital, fenytoïne en topiramaat), waarbij met valproïnezuur het grootste risico lijkt te bestaan [zie *Folia maart 2015* en *Folia april 2023*]. In verband met topiramaat: zie
- Risico's van geneesmiddelen bij mannen met kindervens [zie ook *Folia mei 2024*]
  - Bepaalde geneesmiddelen, zoals finasteride en SSRI's, kunnen de spermakwaliteit beïnvloeden. Dit is meestal reversibel na stopzetting van de behandeling.
  - Beperkt onderzoek wijst niet op een verhoogd teratogeen risico van geneesmiddelen gebruikt door de vader in de periode vlak voor de conceptie, behalve mogelijk bij valproïnezuur. Een studie suggereert dat er mogelijk een verhoogd risico is op ontwikkelingsstoornissen bij kinderen wiens vader in de drie maanden vóór de bevruchting valproaat gebruikte [zie *Folia mei 2024*].

## INL. 6.5. Geneesmiddelen bij borstvoeding

- Hierna volgen de algemene principes over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de periode van borstvoeding. Hoe deze algemene principes in het Repertorium worden toegepast, vindt u in *Inl.2.6*.
- Zie *Folia december 2006*.
- Een aantal geneesmiddelen met **intrinsieke orgaantoxiciteit** die in hoge concentraties in de moedermelk worden uitgescheiden zijn in principe gecontra-indiceerd tijdens de periode van borstvoeding: bv. antitumorale middelen, lithium.
- Daarnaast moet men ook voorzichtig zijn met geneesmiddelen die een **sederend effect** hebben: bv. opioïden, benzodiazepines en Z-producten, en sederende antihistaminica.
- De meeste geneesmiddelen kunnen tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt mits **observatie** van het kind; het is belangrijk, waar mogelijk, de borstvoeding voort te zetten.
- **Het tijdstip van geneesmiddelinname heeft belang, vooral bij eenmalig of occasioneel gebruik.** Voor



kortwerkende geneesmiddelen (korte halfwaardetijd of geen vertraagde vrijstelling) wordt geadviseerd om het geneesmiddel te geven onmiddellijk na een borstvoeding: aangezien de geneesmiddelenconcentratie in de moedermelk meestal de concentratie in het plasma volgt, wordt hierdoor bij de volgende borstvoeding de piekconcentratie vermeden.

- Een aantal geneesmiddelen **stimuleren de lactatie** (dopamine-antagonisten zoals domperidon, metoclopramide, antipsychotica). Domperidon wordt soms gebruikt om de lactatie te bevorderen, maar of dit klinisch relevante voordelen biedt, is controversieel [zie *Folia november 2017*].
- Sommige geneesmiddelen kunnen **de lactatie remmen**: vooral geneesmiddelen met dopaminerg effect, geneesmiddelen met vasoconstrictorische eigenschappen en mogelijk ook diuretica en antihistaminica [zie *Folia mei 2023*].
- Voor de ergotderivaten **bromocriptine en cabergoline** wordt lactatieremming als **indicatie vermeld in de SKP**. Bromocriptine en cabergoline kunnen gebruikt worden wanneer lactatieremming gewenst is door de vrouw of om medische redenen, en niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende zijn (voor bromocriptine is indicatie in SKP beperkt tot vrouwen bij wie borstvoeding moet vermeden worden). Postpartum zijn bij de moeder zeer zelden ernstige cardiovasculaire, neurologische en psychiatrische ongewenste effecten gerapporteerd *Repertorium hoofdstuk 6.8.* en *Folia november 2014*.

## INL. 6.6. Geneesmiddelen bij ouderen - Formularium Ouderenzorg - Selecties 80+

### Ouderen: een kwetsbare groep die veel geneesmiddelen gebruikt

- Hoewel ouderen een zeer heterogene groep vormen, zijn ze over het algemeen kwetsbaarder als het gaat om geneesmiddelen. Bij ouderen spelen verschillende factoren een rol: multimorbiditeit en daaraan verbonden polyfarmacie, alsook een verhoogd risico op geneesmiddeleninteracties en een verhoogde gevoeligheid voor ongewenste effecten, door farmacodynamische en farmacokinetische wijzigingen (o.a. door een verminderde nier- en leverfunctie).
- Oudere patiënten en patiënten met multimorbiditeit worden bovendien vaak uitgesloten van klinische studies, waardoor de beschikbare gegevens om de risico-batenverhouding van een geneesmiddel voor deze populatie correct te beoordelen, beperkt zijn.

### Gepast voorschrijven: uitdagingen en hulpmiddelen

- Een voorschrift voor een patiënt wordt **beschouwd als gepast wanneer** de risico-batenverhouding van elk geneesmiddel bekend is en aanvaardbaar wordt geacht, de voorgeschreven doses correct zijn en de farmaceutische vorm van het geneesmiddel aangepast is om de therapietrouw te bevorderen.
- Verschillende soorten problemen kunnen zich voordoen:
  - Er is sprake van overmedicatie en het onnodig voortzetten van een chronische behandeling.
  - Er is sprake van ondermedicatie, waarbij een risico of pathologie niet wordt behandeld, hoewel een passende behandeling gerechtvaardigd zou zijn.
  - De vorm en/of dosering is niet afgestemd op de patiënt.
  - Er zijn ongewenste effecten en/of interacties tussen geneesmiddelen.
  - Therapeutische cascades: een ongewenst effect wordt geïnterpreteerd als een nieuw medisch probleem, waarvoor dan een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven.
  - Er zijn problemen met de therapietrouw.
- De veiligheid van de geneesmiddelen is een bijzonder cruciaal criterium voor de kwetsbare ouderen, die vaak te maken hebben met multimorbiditeit en polyfarmacie. Een **regelmatig medicatienazicht** wordt aanbevolen, vooral bij oudere patiënten die meer dan vijf geneesmiddelen chronisch gebruiken, en bij voorvallen die kunnen wijzen op ongepast gebruik (een val, een malaise,...). In dergelijke situaties is een klein potentieel voordeel op het vlak van de symptomen of het risico op langere termijn niet altijd voldoende om de nadelen van de behandeling te rechtvaardigen. Dan moet het stopzetten van bepaalde geneesmiddelen soms worden overwogen (*Deprescribing*; zie *Inl.6.7*), maar het is essentieel om dat vooraf te bespreken met de patiënt (en eventueel met de mensen in de naaste omgeving van de patiënt). Er



bestaan hulpmiddelen zoals de STOPP/START-criteria, de Beers-lijst, de MAI of de GheOPS-tool, om de geschiktheid van elk geneesmiddel voor een bepaalde patiënt te beoordelen (zie ook Inl.6.7).

- Het **Therapeutisch formularium**, waarin de geneesmiddelen worden geselecteerd voor een specifieke patiëntenpopulatie, is ook een middel om het rationeel gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Verschillende organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), raden het gebruik van zo'n formularium aan.

Het **Formularium Ouderenzorg**: een hulpmiddel voor rationeel voorschrijven

- Het "Formularium Ouderenzorg" werd opgestart in 2003 in het kader van een nationaal project dat wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en universiteiten verenigt, met de financiële steun van het RIZIV. De bedoeling van het project was om te voldoen aan de criteria van het koninklijk besluit van 24 juni 1999, dat de normen voor de erkenning van woonzorgcentra vastlegde. Dat koninklijk besluit beschreef meer bepaald de opdrachten van de Coördinerend en raadgevend arts (CRA), waaronder het opstellen en gebruiken van een "Therapeutisch formularium". De uitwerking van dat formularium werd toevertrouwd aan de vzw Farmaka, met als inspiratiebron het "Huisartsen Geneesmiddelenformularium" van het OCMW van Gent. Sinds 2018 heeft het BCFI de opvolging van het project "Formularium Ouderenzorg" overgenomen.
- Het "Formularium Ouderenzorg" is een **lijst met geneesmiddelen** die speciaal geselecteerd zijn voor zeer oude personen, hier willekeurig gedefinieerd als mensen ouder dan 80 jaar ("80+"). Het formularium is gericht op de behandeling van de vaakst voorkomende pathologieën in de huisartspraktijk (eerstelijnszorg). Een werkgroep, bestaande uit artsen en apothekers uit de praktijk, zowel Franstalige als Nederlandstalige, komt regelmatig samen om de selecties bij te werken en aan te passen op basis van nieuwe relevante publicaties, volgens een vooraf bepaald besluitvormingsproces en in samenwerking met redacteurs van het BCFI. De geraadpleegde bronnen zijn dezelfde als die van het Repertorium (zie Inl.2.1.) met bijkomend 3 geriatrie tijdschriften: *Age and Ageing*, *Journal of the American Medical Directors Association* (JAMDA) en *Journal of the American Geriatrics Society* (JAGS).
- De selectie is niet exhaustief of bindend, maar moedigt rationeel voorschrijven aan. In het algemeen wordt slechts één geneesmiddel uit een therapeutische groep gekozen. Als er voor bepaalde vaak voorkomende pathologieën geen selectie wordt voorgesteld, dan is dat omdat de risico-batenverhouding bij ouderen als ongunstig wordt beschouwd.
- De selecties zijn gebaseerd op de WHO-criteria voor goed voorschrijven:
  - werkzaamheid (zoveel mogelijk gebaseerd op studies waaraan voldoende ouderen deelnamen),
  - veiligheid,
  - afstemming op de individuele patiënt (o.a. contra-indicaties en farmaceutische vorm)
  - en kostprijs. Soms, wanneer sterke evidentie ontbreekt, wordt de selectie gemaakt op basis van consensus over goede medische praktijk.
- In het Repertorium worden de selecties aangeduid met het symbool  naast de overeenkomstige specialiteiten.
- Voor elk geselecteerd geneesmiddel is er een **geneesmiddelenfiche** beschikbaar op onze website, via het symbool  naast de betrokken specialiteiten. De volledige geneesmiddelenselectie van het Formularium Ouderenzorg is te vinden *op deze pagina van onze website* (via het tabblad publicaties>formularium ouderenzorg). Elke fiche bevat de volgende gegevens:
  - de indicaties, met eventueel bijkomende voorwaarden, waarvoor het geneesmiddel wordt geselecteerd,
  - de motivatie voor die keuze,
  - aandachtspunten bij het voorschrijven van dit geneesmiddel of deze geneesmiddelenklasse bij oudere patiënten:
    - specifieke doseringen, aangepast aan de leeftijd of aan een verminderde nierfunctie;
    - praktisch advies voor het innemen (of toedienen) van het middel, de deelbaarheid;
    - voorzorgen voor het gebruik, vooral bij ouderen.
  - de rubrieken ongewenste effecten, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen: het



gaat om de rubrieken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (voor de therapeutische groep waartoe het geselecteerde geneesmiddel behoort).

### INL. 6.7. “Deprescribing”

- “Deprescribing” is een integraal onderdeel van het voorschrijfproces. Wanneer een geneesmiddel ongeschikt of onnodig is geworden, moet worden overwogen om het te verminderen of stop te zetten. Het is essentieel om dat vooraf te bespreken met de patiënt (en eventueel met de mensen in de naaste omgeving van de patiënt).
- Een **regelmatic medicatienazicht** wordt aanbevolen voor patiënten die meer dan vijf geneesmiddelen chronisch gebruiken, en bij voorvallen die kunnen wijzen op ongepast gebruik (een val, een malaise,...). Voor meer informatie hierover, zie *Folia september 2024* (de verschillende begeleidingsgesprekken Goed Gebruik van Geneesmiddelen, GGG) en *Folia april 2023* (Medicatiezicht door de huisapotheker: een nieuw initiatief).
- Er bestaan hulpmiddelen zoals de STOPP/START-criteria, de Beers-lijst, de MAI of de GheOPS-tool, om de geschiktheid van elk geneesmiddel voor een bepaalde patiënt te beoordelen.
- Wanneer wordt overwogen om met geneesmiddelen te stoppen, is het best om, indien mogelijk:
  - slechts één geneesmiddel tegelijk af te bouwen of stop te zetten, afhankelijk van de prioriteit van de problemen,
  - het geneesmiddel geleidelijk en stapsgewijs af te bouwen (behalve in geval van gevaarlijke ongewenste effecten), met aandacht voor het optreden van onttrekkingsverschijnselen en het opnieuw optreden van het probleem dat door het geneesmiddel werd behandeld.
- Zie ook *GGG Medicatienazicht* en Auditorium (e-learning):
  - *Geneesmiddelen bij ouderen - Geneesmiddelennazicht*
  - *Geneesmiddelen bij ouderen - Deprescribing*
  - *Afbouwen van benzodiazepines*
  - *Afbouwen van opioïden*
  - *Afbouwen van antidepressiva*
  - *Geneesmiddelen en valrisico*

## INL. 7. Geneesmiddelenintoxicaties en medische urgenties

### INL. 7.1. Geneesmiddelenintoxicaties

Zie 20.1. (voor de antidota) en *Folia januari 2011*.

Men kan steeds informatie vragen bij het Antigifcentrum (**tel. 070 245 245**). Het Antigifcentrum heeft ook een aantal antidota in voorraad (meer informatie via [www.antigifcentrum.be](http://www.antigifcentrum.be)).

Planmatige aanpak en behandeling zijn belangrijk.

- In de eerste plaats dient men de *vitale functies* te beoordelen en zo nodig de klassieke maatregelen voor ondersteuning te nemen. Gedaald bewustzijn door hypoglykemie, koolstofmonoxide of opiaten dient onmiddellijk opgespoord en adequaat behandeld te worden. Dit geldt eveneens voor convulsies uitgelokt door intoxicaties.

- Vervolgens moet de *ernst* van de intoxicatie worden ingeschat: over welke geneesmiddelen gaat het?, in welke hoeveelheid en wanneer werden ze ingenomen?, is er co-ingestie van andere middelen zoals drugs of alcohol? De anamnese kan echter onbetrouwbare gegevens opleveren, zeker bij intentionele auto-intoxicatie, met onderschatting van de ernst van de toestand. Ook gegevens uit klinisch onderzoek zijn belangrijk. Men dient echter voor ogen te houden dat de afwezigheid van symptomen misleidend geruststellend kan zijn (bv. bij paracetamolintoxicatie). In geval van intentionele intoxicatie mogen dringende psychiatrische evaluatie en hulpverlening niet vergeten worden.

- *Specifieke antidota* zijn beschikbaar voor een beperkt aantal intoxicaties. Specifieke antidota worden toegediend in hospitaalmilieu, zelden in de eerste lijn. Een ziekenhuis dat patiënten met een acute intoxicatie opvangt, dient uiteraard een reeks antidota in voorraad te hebben. Het Antigifcentrum kan de ziekenhuisapotheker helpen om



een lijst op te stellen van de meest geschikte antidota voor de behandeling van acute intoxicaties. In 20.1. worden de als geneesmiddel vergunde antidota vermeld.

- Bepaalde technieken laten toe de gastro-intestinale resorptie van geneesmiddelen te beperken of de eliminatie ervan te versnellen. Bij gebrek aan gerandomiseerde, gecontroleerde studies werden op basis van consensus van experts de volgende richtlijnen opgesteld. Het Belgisch Antigifcentrum geeft adviezen voor medische professionals: “*Algemene aanpak bij behandeling van acute intoxicaties*” (laatst geraadpleegd op 04/03/2024).

- *Actieve kool*, als adsorberend middel, is zinvol bij orale inname van een potentieel gevaarlijke hoeveelheid toxisch product indien het binnen het uur na de intoxicatie wordt toegediend; een mogelijk nut bij latere toediening is niet uitgesloten. Bij intoxicatie met een geneesmiddel in de vorm van tabletten met verlengde afgifte, kan actieve kool nog meerdere uren na de inname nuttig zijn. Er dient rekening te worden gehouden met een risico van aspiratiepneumonie door de actieve kool bij patiënten met verminderd bewustzijn of patiënten die braken.
- *Maagspoeling* mag niet routinematig worden toegepast. Factoren zoals de ernst van de intoxicatie, de kans dat een maagspoeling een klinisch belangrijke hoeveelheid van het geneesmiddel zal verwijderen (o.a. afhankelijk van de tijd sinds de inname) en het risico van de procedure (o.a. aspiratie, trauma van de slokdarm), moeten in rekening worden gebracht.
- **Uitlokken van braken met ipecasiroop** heeft geen plaats meer.
- *Darmlavage* met polyethyleenglycol wordt soms toegepast bij sommige intoxicaties met middelen met verlengde afgifte.
- Voor het gebruik van *laxativa* bij intoxicaties zijn er geen argumenten.
- *Geforceerde diurese* door gebruik van lisdiuretica (zie 1.4.1.2.) of **alkalische diurese** is zelden aangewezen, en enkel voor producten die als dusdanig door de nieren worden geklaard en tubulaire reabsorptie ondergaan (alkalische diurese kan bijvoorbeeld aangewezen zijn bij bepaalde patiënten met salicylaatintoxicatie).
- *Hemodialyse en andere epuratietechnieken* kunnen in een beperkt aantal intoxicaties nuttig zijn.
- *Intraveneuze toediening van een lipidenemulsie* kan nuttig zijn bij ernstige intoxicaties door lokale anesthetica; de plaats bij andere intoxicaties is niet duidelijk.
- Bij sommige intoxicaties kan ook **hypertone glucose met insuline** gebruikt worden.

## INL. 7.2. Geneesmiddelen in de urgentietrouse van de huisarts

Het is niet gemakkelijk uit te maken wat de verantwoorde samenstelling van een urgentietrouse is. De keuze berust dan ook voor een groot deel op persoonlijke ervaring. Daarbij zullen de eisen voor een arts met een praktijk dicht bij een ziekenhuis met een gespecialiseerde spoedgevallendienst en een mobiele urgentiegroep (MUG), anders zijn dan voor een arts op grote afstand van een dergelijk ziekenhuis. Ook moet worden gewezen op de eisen in verband met de bewaring van bepaalde geneesmiddelen en op de noodzaak de vervaldata te respecteren.

De apotheker mag geneesmiddelen voor menselijk gebruik afleveren voor de urgentietrouse van een voorschrijver indien ze zijn voorgeschreven op een origineel, gedateerd en ondertekend papieren document, dat de naam en het adres van de voorschrijver evenals de vermelding “urgentietrouse” draagt (KB 21 januari 2009).

In *Tabel If* wordt een voorstel van samenstelling van een urgentietrouse voor de huisarts gegeven. De lijst vermeldt telkens één product uit de soms talrijke mogelijkheden; dit sluit uiteraard andere keuzes niet uit. Vanzelfsprekend is het nuttig naalden en spuiten, een perifere katheter en een voorzetskamer ter beschikking te hebben; in sommige gevallen kunnen ook een infuusnaald en een infuusvloeistof, en eventueel vloeibare zuurstof met mondmasker, nuttig zijn.

De werkgroep “ontwikkeling richtlijnen eerste lijn” heeft aanbevelingen gepubliceerd in verband met het gebruik van de urgentietrouse: “Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn (deel 1)” (Cloetens H et al., 13/11/2020; via [ebp-guidelines.be](http://ebp-guidelines.be) of *Domus Medica*) en “Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn (deel 2)” (Cloetens H et al., 21/09/2022; via [ebp-guidelines.be](http://ebp-guidelines.be)).

**Tabel If. Geneesmiddelen in de urgentietrouse**



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Analgetica</i>                                          | - paracetamol (oraal)<br>- morfine amp. 10 mg/1 ml (s.c. - i.m. - i.v.)                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Antiaggregans</i>                                       | acetylsalicylzuur 160 - 325 mg tabletten, bij voorkeur in oplosbare vorm                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Vasodilator</i>                                         | isosorbidedinitraat tabl. (sublinguaal) 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Agitatie (zonder tekenen of vermoeden van psychose)</i> | orazepam tabl. 1 mg en 2,5 mg Expidet®<br>midazolam amp. i.m. 15 mg/3 ml (of 5 mg/5ml)                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Anti-emeticum</i>                                       | metoclopramide amp. 10 mg/2 ml (i.m. - i.v.)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Anti-epileptica</i>                                     | midazolam amp. i.m. 15 mg/3ml<br>kinderen:<br>- kinderen < 25 kg: midazolam amp. i.m. 5 mg/5ml (de midazolam ampullen kunnen ook, off-label, buccaal toegediend worden);<br>- kinderen tot 18 jaar: ook midazolam buccale oplossing in voorgevulde spuit of eventueel diazepam amp. 10 mg/2ml via rectiole |
| <i>Anticholinergicum</i>                                   | bv. biperideen 5 mg/1 ml amp. (niet beschikbaar in België, import te overwegen)                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Antihistaminicum parenteraal</i>                        | bv. clemastine 2 mg/2 ml amp. (niet beschikbaar in België, import te overwegen)                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Antipsychoticum</i>                                     | haloperidol amp. 5 mg/1 ml (i.m.)<br>risperidon tabl. (deelb.) 1 mg of 2 mg                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Anxiolyticum</i>                                        | middellangwerkend benzodiazepine (oraal), bv. lorazepam tabl. 1 mg en 2,5 mg Expidet®                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Bronchodilatoren</i>                                    | - salbutamol dosisaerosol<br>- ipratropium dosisaerosol                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Corticosteroïden</i>                                    | - methylprednisolon amp. 40 mg/ml en 125 mg/2 ml (i.m. - i.v.) (bij voorkeur zonder bewaarmiddel) en tabl. 32 mg (oraal)<br>- betamethason druppels 0,5 mg/ml (oraal)                                                                                                                                      |
| <i>Diureticum</i>                                          | furosemide amp. 20 mg/2 ml (i.m. - i.v.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Hyperglykemiërende middelen</i>                         | - glucagon amp. 1 mg/1 ml Hypokit (i.m. - i.v. - s.c.) of nasaal poeder unidose (3 mg)<br>- glucose amp. 3 of 5 g/10 ml (i.v.) of 10% infuus                                                                                                                                                               |
| <i>NSAID</i>                                               | diclofenac amp. 75 mg/3 ml (i.m.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Opioidantagonist</i>                                    | naloxon amp. 0,4 mg/1ml (i.m.-i.v.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Oxytocicum</i>                                          | oxytocine amp. 10 E/1 ml (i.m. of traag i.v.)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Sympathicomimeticum</i>                                 | Adrenaline (syn. epinefrine) amp. 1 mg/1 ml (1/1.000) (i.m.) of in voorgevulde spuit, of een auto-injector voor volwassenen en een auto-injector voor kinderen                                                                                                                                             |



### INL. 7.3. Behandeling van anafylactische reacties

- Anafylactische reacties zijn altijd potentieel levensbedreigend. Wanneer een anafylactische reactie optreedt, moet dit beschouwd worden als een urgentie, en moet in de ambulante zorg de Noodcentrale 112 worden gebeld.
- **Geneesmiddelen die anafylactische reacties kunnen uitlokken**, zijn o.a. ACE-inhibitoren en sartanen, penicillines, cefalosporines, acetylsalicylzuur, NSAID's, chemotherapeutica, contraststoffen, lokale anesthetica, vaccins (zie 12.1. > Bijzondere voorzorgen). Kruisreacties zijn mogelijk, bijvoorbeeld tussen penicillines onderling, tussen NSAID's onderling en tussen penicillines en bepaalde cefalosporines.
- Bèta-blokkers kunnen het verloop van een anafylactische reactie verergeren en het antwoord op adrenaline verminderen.
- **Aanpak van anafylaxie** [bron: "Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn" (deel 1, 2020, WOREL, Ebpracticenet)]:
  - **Bij hemodynamische problemen of ademhalingsproblemen is een spoedeisende aanpak noodzakelijk.**
  - **Adrenaline (syn. epinefrine) is de hoeksteen van de behandeling en moet onmiddellijk worden toegediend bij vermoeden van anafylaxie.**
    - **Farmaceutische vormen (zie 1.9.1.):**
      - Adrenaline is beschikbaar in ampullen van 1 ml met 0,4 mg of 1 mg adrenaline.
      - Adrenaline is ook beschikbaar in auto-injectoren (voorgevulde pen) voor intramusculaire toediening met 0,15 mg adrenaline/dosis (voor gebruik bij kinderen < 20 kg) of met 0,3 mg adrenaline/dosis (voor gebruik bij kinderen > 20 kg en volwassenen), die bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn voor personen met bekende overgevoeligheid voor bijen-, hommels- of wespensteken, voor pindanoten, of voor vis en schaaldieren (zie 1.9.1.). De patiënten en hun omgeving moeten wel instructies krijgen over hoeveel en hoe toe te passen [zie *Folia februari 2013*]. Ook artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars die zelden geconfronteerd worden met anafylaxie kunnen auto-injectoren gebruiken. **Nota bene:** de auto-injectoren zijn slechts beperkt houdbaar (gedurende 19 maanden tot 2 jaar, afhankelijk van de specialiteit).
    - **Ongewenste effecten:** ongewenste effecten zoals myocardischemie, hartritme stoornissen en hypertensieve crisis zijn mogelijk, maar deze zijn bij intramusculaire toediening van de correcte dosis zeldzaam.
    - **Toedieningsweg:**
      - De intramusculaire toediening in de laterale zijde van de dij heeft de voorkeur boven de subcutane, gezien de betere resorptie in geval van hypotensie.
      - Intraveneuze toediening wordt slechts toegepast door een gespecialiseerd team; hierbij moet de oplossing adrenaline eerst verdund worden (tot 1/10.000) en de injectie moet traag gebeuren, onder cardiale monitoring.
    - Dosis adrenaline: zie *Tabel Ig*.

#### **Tabel Ig. Dosis adrenaline**

- *Zuurstof* wordt met hoog debiet via een mondmasker toegediend indien beschikbaar.
- *Kortwerkende  $\beta_2$ -mimetica via inhalatie* zijn aangewezen ter verlichting van de ademhalingsklachten door bronchoconstrictie wanneer adrenaline hierop onvoldoende werkzaam is.
- *Corticosteroiden* worden niet meer beschouwd als een essentieel onderdeel van de acute aanpak van anafylaxie. Een gunstig effect op de mortaliteit is onvoldoende bewezen en de evidentie dat corticosteroiden de duur van de anafylactische reactie verkorten en laattijdige verslechtering tegengaan is zwak. De richtlijn "Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn" (2020, WOREL, Ebpracticenet) besluit dat de toediening van een corticosteroid kan "overwogen" worden, maar ziet toediening door de huisarts als niet prioritair. Wanneer toch beslist wordt om een corticosteroid toe te dienen, wordt methylprednisolon in een dosis van 2 mg/kg tot maximum 125 mg intramusculair (bij voorkeur zonder bewaarmiddel), of 32 mg per os aanbevolen.



- Een H<sub>1</sub>-antihistaminicum oraal of parenteraal wordt meestal ook gebruikt wanneer urticaria, oedeem en/of jeuk aanwezig zijn. Deze behandeling heeft echter weinig effect op de hypotensie en het bronchospasme, en heeft bijgevolg geen plaats in de urgente aanpak van anafylactische reacties.
- Een allergische reactie met enkel huidsymptomen voldoet niet aan de definitie van anafylaxie. Wanneer er louter huidsymptomen zijn, is toediening van adrenaline niet noodzakelijk en volstaat vaak een H<sub>1</sub>-antihistaminicum oraal of intramusculair, eventueel in associatie met orale of intramusculaire toediening van een corticosteroid.

## **INL. Referentielijst**